衛署藥製字第 020318 號

"黃氏"

腸 衛 錠

BOWELL TABLETS "H.S."

【成分】Each Tab. Contains：

Mepenzolate Bromide……25mg

Phenobarbital……15mg

【賦形劑】

Potato Starch、Lactose、Talc。

【作用】

本品為抗 Choline 劑，對下部消化管有特異性之選擇作用，對過敏性大腸、急慢性腸炎等大腸機能異常，具有攣縮緩解作用，快速地解除腹痛，腸運動之異常、下痢、便秘鼓腸之症狀，而促進腸機能恢復正常，另含 Phenobarbital 用以遮斷精神神經因素所致大腸機能異常狀態。

【適應症】

大腸機能異常、急慢性腸胃炎所引起之腹瀉、腹痛、腹部膨滿感。

【用法用量】

成人每次一錠，一天 3~4 次，重症者每次可服 2 錠，小孩之劑量可依年齡、體重、症狀之差異而決定。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1.一般注意

a.連續投與時，不可急劇減藥，如出現積聚現象，而欲中止時，須徐徐減量，特別注意。

b.連續長期投與，應做定期肝、腎機能血液檢查。

c.會引起嗜眠、注意力不集中，反射運動能力降低、因此投與本劑時，應避免從事開車、機械操作等須集中注意力的工作。

2.禁忌

a.對 barbituric acid 衍生物過敏者。

3.慎重投與

a.高齡者、虛弱者（會引起呼吸抑制）。

b.頭部外傷後遺症及動脈硬化患者。

c.心障害、肝障害、腎障害患者。

d.呼吸機能低下患者。

e.急性間欠性 porphyran 症患者。

f.藥物過敏症患者。

g.alcohol 中毒、藥物依賴傾向及有以上病歷患者。

h.重症神經症患者。

4.副作用

a.過敏症 : 少有猩紅熱樣、麻疹樣、中毒疹樣、發疹等過敏症狀，如有以上症狀者即停藥。

b.皮膚：Stevens-Johnson 症狀群（皮膚粘膜眼症候群），Lyell 症候群（中毒性表皮壞死症），如有以上現象，應即停藥。

c.依賴性 : 連續使用會產生藥物依賴性 , 不可超量 , 應慎重投與，連續使用不可急劇減量，以免不安、不眠、痙攣、噁心、幻覺、妄想、興奮、錯亂等禁斷症狀出現。

5.孕婦投與：須判斷治療有益性大於危險性方可使用。

6.相互作用

a.飲酒及併用以下藥品會有增強作用，應酌以減量：

phenolthiazine 衍生物、barbituricacid 衍生物、tranquilizer 等中樞經抑制劑、三環系抗抑鬱症、monoamine oxidase inhibitor、disulfiram、antihistamine 藥品、thiazide 系降壓利尿劑。

b.本品會影響 coumarine 系抗凝血時間，因此常測血液凝固時間，以調整抗凝血劑量。

c.與 Acetazolamide 併用會出現軟骨症，應慎重投與。

7.不良反應：對於 Barbiturates 類藥品具高度敏感性病人之不良反應主要為過敏反應，包括局部腫脹(localized swelling)、紅斑性皮炎(erythematous dermatitis)。在極少數情形下，使用 phenobarbital 成分藥品的病人可能會發生剝落性皮膚炎(exfoliative dermatitis)的不良反應，如史蒂文生氏-強生症候群(Stevens Johnson syndrome)及毒性表皮壞死溶解症(toxic

epidermal necrolysis)等，嚴重可能會導致死亡)。

【包裝】6-1000 粒瓶裝。

【儲存】25℃以下儲存。