
錠劑：衛署藥製字第 019445 號
注射液：衛署藥製字第 020359 號

“瑞士”凱服樂 Kphadol 錠 注射液 Tablets Injection （敵芬尼朵） “Swiss” （**Diphenidol**）

近來由於生活環境之複雜及交通事故遭殃之頭部外傷及其後遺症之急增，“眩暈”已成為現代病之一，而“眩暈”患者日劇增加，今日對於“眩暈”之治療劑不但需由臨床藥理學上立場更需由實驗藥理學之立場加以探索研究，本品就是依據由此見地究明之新作用機序開發推出之新藥劑。



【成　　分】

凱服樂錠　Each tablet contains：
Diphenidol Hydrochloride……..25 mg

凱服樂注射液　Each ml contains：
Diphenidol Hydrochloride……22.4 mg

【賦 形 劑】

凱服樂錠　Lactose、Avicel、Primojel、Silicone Dioxide、Magnesium Stearate

凱服樂注射液　Sodium Tartrate、Tartaric Acid、Phenol、Water For Injection

【藥理作用】

（一）改善椎骨腦底動脈之循環不全：
對患側椎骨動脈之血管攣縮，具有選擇性，緩解作用，能除去患側與健側之血流量不平衡現象。

（二）調整前庭神經路之機能：
能在前庭神經核Level遮斷，由末梢前庭神經進入之異常刺激，更能在高位前庭性視床下部抑制刺激之傳達。

（三）抑制異常眼振：
能延長眼振出現時之潛伏期時間並減少眼振之發生頻度。

【適 應 症】

凱服樂錠　因內耳障碍引起之眩暈（包括腦血管障碍及頭頸部外傷後遺症之眩暈）眼振。

凱服樂注射液　因內耳障碍引起之眩暈（包括腦血管障碍及頭頸部外傷後遺症之眩暈）。

【用法用量】

凱服樂錠　本藥須由醫師處方使用。

通常成人一次 1～2 錠，一日 3 次，飯後服用，依年齡症狀適宜增減。

凱服樂注射液　本藥限由醫師使用。

肌肉注射：通常成人一次 1～2ml，肌肉深部注射，若症狀未能改善，於一小時後再注射 1ml，以後依需要每隔 4 小時注射 1～2ml。

靜脈注射：通常成人一次 1ml，徐徐靜脈內注射，若症狀未獲改善，於一小時後再注射 1ml，並儘量可能時改為肌肉注射或口服。**（注意事項：本劑不適於作皮下注射，有過心竇性心博過速之病患，不可靜脈注射投與）。**

小孩用量：

體重（磅）	肌肉注射
25～50	0.25～0.5ml
50～75	0.5～0.75ml
75～100	0.75～1ml

【包　　裝】

凱服樂錠　1000 粒以下瓶罐裝、盒裝。

凱服樂注射液　1ml/Amp.　2ml/Amp.　100Amps.

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號