

非比林系鎮痛、解熱良藥
"明通" 治痛丹散
Chyr Tong Dan San "Min Tong"

衛署藥製字第 020574 號

【成分】

有效成分及含量：Each package(Gm) contains:

Ethoxybenzamide.....350 mg

Acetaminophen.....200 mg

Bromvalerylurea.....200 mg

Caffeine Anhydrous.....50 mg

其他成分(賦形劑)：

Neusilin, Corn starch, Starch pregelatinized, Magnesium stearate.

【用途(適應症)】

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(二) 有蠶豆症的人。

(三) 懷孕 2 8 週以上的婦女。

(四) 1 8 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 1 2 歲以下。

(二) 成人連續服用本藥超過 7 天，1 2 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。

(三) 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。

(四) 有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 曾有消化性潰瘍的人。

(三) 同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。

(五) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。

(六) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	每日使用次數	每次使用劑量
成人	一日 3 次，飯後服用	1 包(1 公克)
8 歲以上未滿 15 歲	一日 3 次，飯後服用	1/2 包(0.5 公克)
5 歲以上未滿 8 歲	一日 3 次，飯後服用	1/4 包(0.25 公克)

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振、胃腸不適、胃腸出血。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 服用本藥 3 天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
- (三) 服用過量〔每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (四) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 1 公克鋁箔紙裝、300 公克塑膠瓶裝。

【儲存方式】 請勿超過 30°C。

PIC/S GMP 優良藥品

明通化學製藥股份有限公司第二廠

台中市南屯區文山里工業區二十一路十五號

<P-16/2016.12>