

“新喜”

佑感膠囊

Unican Capsules “N.C.P.”

醫師藥師藥劑生指示藥品

【成分】 Each Capsule contains :

有效成分及含量：	Ethenzamide.....	330mg
	Paracetamol.....	100mg
	Chlorpheniramine Maleate.....	2.5mg
	Noscapine.....	10mg
	DL-Methylephedrine HCl.....	10mg
	Potassium Guaiacolsulfonate.....	80mg
	Caffeine Anhydrous.....	30mg

賦形劑：Lactose

藍白硬空膠囊成分：

Cap：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Purified Water

Body：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Purified Water

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喀痰、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保存。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (1) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (2) 服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 18歲以下不建議自行服用。
 - (2) 曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻竇藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸煙、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥物超過七日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因可能造成肝損害及胃出血。
12. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 本藥不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群(Reye's Syndrome)。
 - (2) 曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
13. 蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不宜服用本藥。

14. 懷孕第三期婦女不得使用。

15. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

- (1) 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。
不要飲用含有酒精之飲料，易部用服用安眠藥、鎮定劑之類的藥品。
- (2) 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

16. 本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

17. 本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：

- (1) 應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
- (2) 為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

一日3次，飯後半小時內服用為宜。18歲以上，每次1粒。

【包裝】

1000粒以下塑膠瓶裝。

【儲存條件】：

室溫(15~25°C)儲存。



新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮4-6號