


風濕關節炎疾患治療劑

“居禮”風落錠 (那普洛先)

HONLOW TABLET “Curie” (Naproxen)

本公司較新有效治療風濕性關節炎諸症之藥物，由本製劑為非類固醇消炎劑屬於芳香乙酸類衍生藥物，其化學式為：



為一種有力的全身性抗炎劑。實驗證明其抗炎作用與鎮痛作用，為同類製劑之數倍。口服吸收迅速，血藥半生期10~17小時，血中濃度與水楊酸鹽無分軒輊，可有效地解除風濕性關節炎症狀。本製劑的開發成功，解決患者因使用Ibuprofen或Ketoprofen藥物之副作用的困擾。誠為藥效活性與安全性達優異均衡之消炎鎮痛製劑。

成分：每錠含有

Naproxen

250mg

特點：

1. 非類固醇藥物以本製劑研究最透徹，抗風濕效強，副作用較Aspirin, Indomethacin, Phenylbutazone為低。
2. 解除痛楚與發炎；已有六年以上之臨床試驗—動物試驗中，鎮痛效果比Aspirin高7~20倍，抗炎效果達55倍。人體試驗與Aspirin, Indomethacin等在同劑量下同樣有效。和較新的非類固醇藥物如：Ibuprofen, Ketoprofen等比較，大家競用本劑，因Naproxen藥效高，副作用低。
3. 改善功能活動性—能改善風濕病人生活態動圓潤臥，抓握強度，走路，爬樓梯時間，頸仰角，並減輕痛楚。
4. 作用迅速—腸胃道吸收快，因此對急性突發關節炎尤具療效，能迅速發揮強烈消炎效果。
5. 作用持久—藥量低，一日只服兩次。

臨床藥理：

本劑具消炎、鎮痛、解熱作用，可消除患者之關節腫脹，減輕痛楚，縮短發病時間，緩和病況，增進身體肢體活動性。

對腎上腺切斷者有消炎效果，因此其作用並不經由腦下垂體與腎上腺軸間。能抑制前列腺素合成酶，尚有許多作用模式未詳。

懷孕末期服用本劑對延長分娩與難產有禦。

口服由腸胃道吸收，服用一次，2~4小時內可達最高血中濃度，連服用4~5次後就達「穩定態」達治療基準時，它與血清蛋白的結合達99%以上。約95%由尿中排出，排泄速率與從血漿中消失速率一致。

適應症：

急慢性風濕關節炎，關節局部腫脹，強直性脊椎關節炎，脊椎炎，椎間盤炎，腰節周圍炎，上腕臂甲骨炎及骨骼肌不適之粘液囊炎，腱鞘炎之消炎，鎮痛，解熱。

〔Aspirin會增進本劑之排泄速率，故不適用。孩童之安全，有效劑量資料尚未完整。本劑效果不因病患之年齡，性別，病況與病程而異。〕

禁忌： 對本劑過敏者或曾由Aspirin或他種非類固醇消炎劑引起氣喘，鼻炎，尋麻疹者最好改用他類製劑。

注意事項：

1. 有嚴重消化性潰瘍者，注意使用。
2. 孕婦授乳婦之安全性資料尚未十分完全，斟酌使用。孕婦或產婦服用，懷孕期會延長，生產開始進行後，分娩會延長。
3. 本製劑能通過胎盤障礙，乳餵母乳中含量約為血漿中含量之1%。
4. 和蛋白質有親和力，而可能取代其他藥物與蛋白質結合，導致藥物的交互反應。理論上，製劑本身同樣也會被取代，當病患服用Bihydroxycoumarin或Warfarin（抗凝血藥物），再服用會延長血凝時間。服用Hydantoin（抗癲癇藥物），Sulfonamide（磺胺藥）Sulfonylurea（降血糖藥物之一類），等皆須防止藥物中毒。
5. 本劑會減少血小板之凝聚和延長血凝時間，作凝血試驗時須留意。其消炎鎮痛解熱作用可能隱蔽受感染之徵兆，使用前詳察受感染之情形。
6. 病人服用本劑可能增加尿中第17位置生化類固醇(17-Ketogenic steroids)的量，作定量分析時，該藥物或其代謝物與間一雙硝基苯(m-dinitrobenzene)有交互反應。雖然第十七位羣基質與兩類(17-hydroxycorticosteroid)的測定(Porter-Silber test)並不被影響，最好作腎上腺功能試驗前三天(72小時)暫時停用本製劑。

85

副作用：副作用罕見亦或輕微。下列所述非絕對之副作用。

1. 腸胃道—發生機率依序如下：胃灼熱，噁心，食慾不振，腹痛，便祕，下痢，嘔吐，腸胃出血最罕見。
2. 中樞神經系—發生機率依序如下：頭痛、嗜睡、眩暈、眼花、頭昏意志不能集中，抑鬱。
3. 皮膚症狀—發生機率依序如下：搔癢、皮膚疹流汗、粉刺、紅疹、尋麻疹、紫斑。
4. 心臟血管系—發生機率依序如下：水腫、心悸、呼吸困難。
5. 感覺異常—發生機率依序如下：耳鳴、視力模糊、重聽。
6. 口渴約1/100的機會，其他罕見者，血管神經性水腫、血小板減少症、黃疸等。

服藥過量：

洗胃進行支持療法，服用5公克活性炭，可減低藥物之吸收，急性中毒時可使用Phenobarbital解毒。

用法用量：1

	早晨	夜間
一般治療劑量	1錠	1錠
嚴重日間疼痛及運動性減低	2錠	1錠
夜間嚴重疼痛及或早晨僵直	1錠	2錠

2. 以下情況，起初3星期以每日服用3錠為宜：

- A) 由高劑量的其他抗風濕劑改用本品時。
- B) 以疼痛為主要症狀的骨關節炎。
3. 風濕症關節炎諸症之每日劑量得視臨床反應調整，但以每日375mg~750mg Napoxen為限，長期服用者宜減少每日劑量。

4. 急性痛風：立即服3錠，然後每8小時服1錠，直至病症消失。

本藥須由醫師處方使用。

貯存：避光貯存。

包裝：20粒 50粒 100粒 250粒 瓶裝