

腦血流促進劑

"信隆"
塞利清 錠(辛那伶)

Cyritin Tablets "Shinlon"(Cinnarizine)

- 【 成 分 】 每錠含有
Cinnarizine.....50mg
- 【 作 用 】 Cinnarizine 為血管擴張劑，具有與 Papaverine 類似的平滑肌鬆弛作用，對 Angiotensin, Catecholamine 等血管收縮藥有拮抗作用。本劑能促進腦血流，對狗實驗結果，2.5mg/kg(I.V.)即能增加腦血流量約 2 倍，在臨床試驗，以眼底血壓測定法試驗結果，具有促進腦血流效果，其自覺症狀也獲得改善。
- 【 適 應 症 】 噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病，末稍血管循環障礙。
- 【 用 法 用 量 】 通常成人一次 1/2~1 錠，1 日 3 次服用。依年齡及症狀適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

- 【 禁 忌 症 】 對本藥主成分或賦形劑曾產生過敏反應之患者禁用本藥
- 【 注 意 事 項 】 1. 頭蓋內如有出血的可能時，應在病發後約 10~14 日，推算已經截止時，開始給藥。
2. 如有皮膚、粘膜發疹或紅斑等過敏性反應時，請停止服用。
3. 本品會引起睡意，服用後請勿開車或操作機具。
- 【孕婦、授乳婦之投與】 對孕婦、可能懷孕或哺乳中的婦女，使用前請諮詢醫師。
- 【 副 作 用 】 1. 消化系統：偶有上腹疼痛，噁心，嘔吐等症狀出現。
2. 中樞系統：偶有頭痛、眩暈、思睡、倦怠感等症狀出現。
3. 錐體外路症狀如震顫，嚴謹，運動功能減退症狀產生時宜中止投與

【 賦 形 劑 清 單 】 Lactose、Corn Starch、Potato Starch、Gelatin、Talc、Magnesium Stearate、Carboxymethylcellulose Calcium

【 包 裝 】 3~1000 粒塑膠瓶裝

【 儲 存 條 件 】 25°C 以下，避光儲存

衛署藥製字第 20930 號



信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號

腦血流促進劑

"信隆"
塞利清 錠(辛那伶)

Cyritin Tablets "Shinlon"(Cinnarizine)

- 【成分】每錠含有
Cinnarizine.....50mg
- 【作用】Cinnarizine 為血管擴張劑，具有與 Papaverine 類似的平滑肌鬆弛作用，對 Angiotensin, Catecholamine 等血管收縮藥有拮抗作用。本劑能促進腦血流，對狗實驗結果，2.5mg/kg(I.V.)即能增加腦血流量約 2 倍，在臨床試驗，以眼底血壓測定法試驗結果，具有促進腦血流效果，其自覺症狀也獲得改善。
- 【適應症】噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病，末稍血管循環障礙。
- 【用法用量】通常成人一次 1/2-1 錠，1 日 3 次服用。依年齡及症狀適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

- 【禁忌症】對本藥主成分或賦形劑曾產生過敏反應之患者禁用本藥
- 【注意事項】1. 頭蓋內如有出血的可能時，應在病發後約 10~14 日，推算已經截止時，開始給藥。
2. 如有皮膚、粘膜發疹或紅斑等過敏性反應時，請停止服用。
3. 本品會引起睡意，服用後請勿開車或操作機具。
- 【孕婦、授乳婦之投與】對孕婦、可能懷孕或哺乳中的婦女，使用前請諮詢醫師。
- 【副作用】1. 消化系統：偶有上腹疼痛，噁心，嘔吐等症狀出現。
2. 中樞系統：偶有頭痛、眩暈、思睡、倦怠感等症狀出現。
3. 錐體外路症狀如震顫，嚴謹，運動功能減退症狀產生時宜中止投與

【賦形劑清單】Lactose、Corn Starch、Potato Starch、Gelatin、Talc、Magnesium Stearate、Carboxymethylcellulose Calcium

【包裝】3~1000 粒塑膠瓶裝

【儲存條件】25°C 以下，避光儲存

衛署藥製字第 20930 號



信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號