

解熱，鎮痛劑

## “仙台”消濕痛膠囊

(每非那)

SEUSTON CAPSULES “SENTAI”

(MEFENAMIC ACID)

本劑所含 Mefenamic Acid 具非麻藥性鎮痛作用外尚有抗炎作用，其鎮痛作用中樞性抗炎作用為末稍性，(1) 以動物實驗其鎮痛效果比 Aspirin，Amin- oprin 強，抗炎效果為 Aspirin 之 5 倍，Aminoprin 3.8 倍 Phenylbutazone 之約 1/2。(2) 長期連用亦無習慣及沉溺性。(3) 殆無過敏作用，胃腸障礙少，時會發生腹瀉，此時應即時停止服藥。

【成 分】 Each Capsule Contains :

【主成分】

Mefenamic Acid..... 250 mg

【賦形劑】

Lactose、Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine

【效 能】 鎮痛 (如頭痛、外傷性、產後手術後疼痛，以及牙痛、風濕性骨骼疼痛)

【用法用量】 成人初次劑量為 2 粒 (500mg) 以後每 6 小時服用 1 粒，兒童 (6 個月以上) 6.5mg / kg 每隔 6~8 小時服用 1 次。

本藥須由醫師處方使用。

### 【警語及注意事項】

對肝臟之影響：服用 NSAID 類藥品(包括：mefenamic acid)之患者中，最高有 15% 可能發生單一或多項肝功能指數略為增加之情形。繼續治療後，這些檢查值異常現象可能會惡化、保持不變，或只是短暫現象。在 NSAID 類藥品之臨床試驗中，約只有 1% 之患者通報 ALT 或 AST 顯著升高(約為正常上限之 3 倍以上)。此外，曾被通報之罕見嚴重肝臟不良反應案例，包括：黃疸及致命之猛爆性肝炎、肝壞死、肝衰竭，其中一些為死亡案例。在 mefenamic acid 治療期間，若患者出現肝功能異常之病徵及/或症狀，或肝功能指數異常時，應評估是否發展成更嚴重之肝臟不良反應。若出現肝病之臨床病徵及症狀，或全身性症狀(例如：嗜伊紅性白血球增加、皮疹等)，應立即停藥」。

### 【副作用】

肝膽副作用：單一或多項肝功能指數略為增加、膽汁鬱滯性黃疸、輕度肝毒害、肝炎、肝腎症候群。

【包 裝】 50's、100's、500's、1000's 瓶盒裝。

【許可字號】 衛署藥製字第 20976 號



仙台藥品工業股份有限公司  
臺南市新營區新工路 35 號