"南光"泰百信注射液10公絲/公攝(泰百黴素)

Tobcin injection"N.K."10mg/ml(Tobramycin)

衛署藥製字第021267號

泰百信Tobcin(Tobramycin Sulfate)係由放線菌屬(Streptomyces tenebrarius)產生的一種氨基糖甘抗生素，對G(+)，G(-)(包括綠膿桿菌、變形菌)殺菌力強。Tobcin有類似Gentamicin的殺菌範圍(Antibacterial range)，但同濃度下對綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)Tobcin較強，例如Tobcin 10mg/ml對從患惡性贅疣(malignant neoplasms)病人分離之綠膿桿菌。有80%治癒率，而Gentamicin只有4%。1.56mg/ml之Tobcin即對大部分的G(-)細菌有效。

「組成」:每1ml中含有:

Tobramycin sulfate

10mg(potency)

「作用」:

a)抑制細菌之細胞蛋白的合成，具對各種細菌有殺菌作用。

b)通常對下列菌株有效:

綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)。

變形桿菌屬(Proteus sp.)。

大腸桿菌Escherichia coli)。

克雷白氏桿菌-腸內桿菌-沙雷氏菌屬(Klebsiella-Enterobacter-Serratia sp.)。

葡萄球菌(Staphylococci)包括凝血酶陰性之菌株，如金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)。

「適應症」：

革蘭氏陽性，陰性菌，立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

「用法用量」:

腎盂、腎炎及膀胱炎1日量120mg(力價)分2次注射，其他感染症1日量180mg(力價)，分3次注射。小兒1日量3mg(力價)/kg，分2~3次注射。通常，以病人體重計算正確之劑量，以肌肉注射或靜脈注射。本藥限由醫師使用。

「注意事項」:

1.對第八腦神經的內耳前庭及聽覺分枝有副作用，特別是長期或高劑量之病人，症狀如眩暈、耳鳴、難聽。

2.對肝、腎功能本已減退之病人及高齡者應慎重投與，必要時須作嚴密的臨床觀察。

3.避免與對神經及腎臟有毒性之抗生素，尤其是Streptomycin,Neomycin，Kanamycin,Gentamicin,Cephaloridine,Paromomycin,Viomycin,Polymyxin B,Colistin,Vancomycin及Amikacin合併或連續使用，對上列有過敏症既往病患者不要投與。

「包裝」:

10mg/ml:1ml ×5A・1ml ×10A・1.3ml ×10V,50V・1.4ml ×10V,50V

2ml ×5V・2ml ×10V・10ml ×5V・10ml ×10V

南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX：06-5972033