

益腫腸溶錠 100 毫克(鳳梨酵素)

Izan E.C. Tablets 100mg “LITA” (Bromelain)

本劑是含有植物性的蛋白分解酵素 Bromelain 之腸溶錠，內服後能發揮抗炎症，抗浮腫之作用，並溶解壞死組織及膿，而使其容易吸收或排出。

【成份】 每錠含：

主成份：Bromelain.....100mg
賦形劑：Sodium Starch Glycolate (Primojel)、Lactose (Milk Sugar)、Povidone K-30 (EQ To Polyvinyl Pyrrolidone K30) (PVP K-30) (Povidone K30)、Silicon Dioxide (Hi-Sil)、Magnesium Stearate (EQ To Stearas Magnesium)、Sodium Bisulfite Anhydrous、Tartrazine (FD&C Yellow No.5)、Talc、HPMCP、Polyethylene Glycol 6000、Titanium Dioxide、White Beeswax、Ethanol

【藥物作用及特徵】

- 1.由於炎症所生之 polypeptide (leukotaxine 等) 之作用，自毛細管所溢出 fibrinogen 受局部 thromboplastin 之作用變為不溶性 Fibrin 而閉塞組織間及淋巴腺等，致惹起體液之循環障礙而成為局部腫脹及疼痛之原因。本藥品之主成份 Bromelain 是在腸內受了變化，成活性型之 peptides 而被吸收，故能亢進體內之纖維素溶解能力，除去閉塞組織之 fibrin 凝血等，而改善體液循環，一方面提高血清之抗蛋白分解作用，阻止炎症性 polypeptide 之產生，終於促進局部的炎症、浮腫之消退。
- 2.能促進抗生物質，化學療法劑等之併用藥劑對病巢組織之浸透，擴散而提高治療之效果。
- 3.Bromelain 在應用臨床上之優點，是對 fibrin 有選擇作用，而對血凝固所必要的 fibrin 有選擇的強力作用，而對血凝固所必要的 fibrinogen 沒有作用。
- 4.沒有過敏症及局部反應等之副作用。
- 5.比較注射劑容易調節其投與量。
- 6.對全身的呼吸與血壓影響少。

【適應症】

手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴喀痰喀出困難、氣管內麻醉後之喀痰喀出困難、痔核。

【用法用量】

通常成人 1 次 1 錠，1 日 4 次，經口投予。視年齡症狀適宜增減。
本藥須由醫師處方使用。

【注意】

- 1.遇有消化器潰瘍、重症的肝、腎機能障礙或血液凝固機能不全時，不可使用本劑。
- 2.伴有感染症者，宜併用適宜抗生素或化學療法劑。
- 3.吞服不可嚼碎。

【儲存】 25°C 以下避光儲存。

【包裝】 8~1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 021491 號



利達製藥股份有限公司

LITA PHARMACY CO., LTD.

台中市大甲區中山路一段 906 號 消費者服務專線 04-26872345

