

“新喜”

## 秘暢腸溶錠 (秘可舒)

Biton E.C. Tablets (Bisacodyl) “N.C.P.”

### 醫師藥師藥劑生指示藥品

#### 【成分】 每錠含有：

有效成分及含量：Bisacodyl.....5mg

賦形劑：Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Sugar、Acacia、Gelatin、Shellac、Calcium phosphate di-basic、Cellulose acetate phthalate、Talc、Carnauba wax

#### 【用途(適應症)】

緩解便秘。

#### 【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

#### 【用法用量】

一日一次，於睡前(或空腹時)服用。成人 1 次 1~2 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。本藥應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

#### 【副作用】

1. 腹痛、腹部絞痛、過敏。
2. 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。

#### 【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
- 六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 歲之嬰幼兒不得使用。
- 八、禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
- 九、長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- 十、本藥須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且使用藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。

#### 【儲存條件】

儲存於 30°C 以下，避光儲存。

#### 【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。



新喜國際企業股份有限公司  
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號