衛署藥製字第 21716 號

“新喜” **必疏痰錠(鹽酸溴克辛)**

Bisoton Tablets “N.C.P.”（Bromhexine Hydrochloride）

醫師藥師藥劑生指示藥品

【成分】Each tablet contains：
有效成分及含量：Bromhexine HCl……………………………8mg
賦形劑：Lactose Granule、Avicel 102、Magnesium Stearate

【用途(適應症)】
祛痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。

【注意事項】
一、 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
四、 勿超過建議劑量。
五、 服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
六、 本藥不得與含酒精飲料併服。

【用法用量】
一天 3 次。

成人	1 次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量
6 歲以上未滿 12 歲	1 次 1/2 錠
3 歲以上未滿 6 歲	1 次 1/4 錠
3 歲以下之嬰幼兒	使用前請洽醫師。

【警語】
一、 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
二、 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
（一）3 歲以下，請洽醫師診治。
（二）曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

【警語及注意事項】
有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens-Johnson syndrome<SJS>/toxic epidermal necrolysis<TEN>)、急性廣泛性發疹性膿皰症(acute generalised exanthematous pustulosis < AGEP>) 等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 ambroxol 或 bromhexine 成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

【不良反應】
免疫系統疾患：
罕　　見：過敏反應(hypersensitivity reactions)
頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)
皮膚及皮下組織疾患：
罕　　見：皮疹、蕁麻疹
頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)。

【包裝】
1000 粒以下塑膠瓶裝。

【儲存條件】
儲存於 30℃以下，避光儲存。
等嚴重皮膚損害，與使用祛痰

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號