

鼻塞、流鼻水之緩解劑

"人生" 樂涕克錠

Romtec Tablets "J. S."

本品含有抗組織胺及血管收縮作用之成分，本藥劑含主成分為 Pseudoephedrine HCl(+)-2-Methylamine-1-phenylpropan-1-01 Hydrochloride)是一種擬交感神經劑，因有血管收縮作用，主要應用於鼻腔及支氣管的去充血作用。另一成分 Carbinoxamine Maleate 是一種抗組織胺藥，有類似 Atropine 之抗 Choline 作用，可阻止 Histamine 的釋放，而緩解打噴嚏、鼻癢。

〔主成分〕：Each Tablet Contains：

Pseudoephedrine Hydrochloride.....60 mg
Carbinoxamine Maleate.....2.5mg

〔賦形劑〕：Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Silicon Dioxide AD-101、Silicon Dioxide AD-102、Polyvidone K-30。

〔適應症〕：

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

〔用法用量〕：

一日 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。成人每次 1 錠，12 歲以上，適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

〔注意事項〕：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

〔警語〕：

- 一、服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。
- 二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
- 五、老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議服用。
- 六、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
- 七、服用本藥不得與酒精性飲料合用。
- 八、除非醫師、藥師或藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
- 九、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
- 十、連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
- 十一、不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。
- 十二、本藥含 Pseudoephedrine Hydrochloride 應注意下列事項：
 - (一)除非醫師、藥師或藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
 - (二)服用 Monoamine oxidase inhibitor(MAOI)期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

〔儲存條件〕 儲存於 25°C 以下。

〔包裝〕 8-28錠PTP鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 22033 號



PIC/S GMP 優良藥廠
人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN