



鎮痛、鎮痙劑 衛署藥製字第 022043 號

## “永吉” 安 利 痛 錠

### Aleton Tablets “Yung Chi”

肌肉疼痛及月經困難症狀在於肌肉痙攣所發生的占有大部分，本品主要含有 Chlormezanone 具有優越之肌肉痙攣作用，更配合有 Acetaminophen 而更能發揮鎮痛作用，因此對於肌肉痛及月經困難諸症狀（腰痛、下腹痛）可迅速的消除其疼痛。

#### 【成 份】

每錠含有：

主成分：

1. Acetaminophen -----450mg
2. Chlormezanone-----100mg

賦形劑：

3. Lactose
4. Potato Starch
5. Polyvinyl Alcohol
6. Hydroxypropyl Cellulose
7. Sodium Starch Glycolate
8. Magnesium Stearate
9. Talc

#### 【特 徵】

1. Chlormezanone 對中樞神經有選擇性抑制作用，而可消除肌肉痙攣及所引起之疼痛。
2. Acetaminophen 為 Acetanilide 及 Phenacetin 在體內之最終有效代謝產物，可迅速發揮鎮痛、解熱之效果。
3. 本劑依合理藥物配合而成，更能發揮鎮痛，消除肌肉痙攣，肌肉痛等症狀，以及可迅速消除月經困難諸症狀（腰痛、下腹痛）。

#### 【效 能】

肌肉痛、月經困難。

#### 【用法用量】

通常成人一次 1~2 錠，一日 3 次飯後服用，依年齡症狀適宜增減之，本藥須由醫師處方使用。

#### 【注 意 事 項】

1. 本劑含有劇毒應切實按照所定服用方法及劑量使用。
2. 在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥劑者，避免重複使用。
3. 避免長期使用。
4. 本劑應置於小孩伸手不及處。
5. 極少數引起多形性紅斑（Erythema Multiforme）、Stevens-Johnson 症候群和毒性皮膚壞死（Toxic epidermal mecro-lysis）案例被報導。

6、本藥含有 acetaminophen(paracetamol)成分，應注意下列事項:

一、肝毒性：

(一) 使用 acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。

大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

(二) 過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。

(三) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

二、與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

三、過量：

(一) 服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

(二) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

(三) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

四、過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

五、嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿胞病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

## 【包 裝】

1000 錠罐裝

永吉製藥股份有限公司

屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號

電 話：(08) 777 2291