

# “生達” 必可舒 錠

## Bicodin Tablets "Standard"

必可舒錠含有三種主要成分，Bromhexine HCl是以印度出產的Adhatoda Vasica中的有效成份Vasicin為基礎，此藥物是屬於Benzylamine衍生物，對於氣管痰液具有極佳之溶解稀薄作用；Orciprenaline Sulfate為新合成之支氣管擴張劑，對於支氣管具有抗痙攣作用，可迅速鬆弛支氣管平滑肌之痙攣。另外Doxylamine Succinate為一種抗組織胺劑，對於氣喘、支氣管痙攣及過敏，具有優良之療效。由於上述三種主要成分之相互配合，藥理學上的相乘作用，因此，必可舒錠誠為目前具有祛痰兼可適用於支氣管氣喘及氣喘性肺、支氣管疾患之極優異治療劑。

主 成 份：每錠含：

Bromhexine HCl.....8mg  
Orciprenaline Sulfate.....5mg  
Doxylamine Succinate.....7.5mg

- 特 點：(1)本品能促進支氣管分泌水份，以稀薄粘稠性的痰液，進而使痰液容易排泄。  
(2)藥效迅速，口服30分鐘後即可發揮祛痰作用，其效力能持續6-10小時之久。  
(3)本品對於支氣管具有抗痙攣作用，並有抗過敏之效果。  
(4)安全性高，無不良副作用。

適 應 症：氣管炎、支氣管炎、支氣管炎性氣腫、支氣管疾患所導致之咯痰困難症、支氣管氣喘及氣喘性肺、支氣管疾患之治療。

用法用量：通常成人每次1錠，1天3次，用量可依症狀、年齡適宜增減之。本藥須由醫師處方使用。

警語及注意事項：

### 1.一般的注意

- a.依照用法用量正確使用，仍確定沒有效果時，得考慮本劑可能不適合，而需停止投與。  
b.應避免連續的過度使用，而引起不整脈、心停止。

### 2.禁忌症：

特發性肥大大動脈瓣下狹窄症之患者。

### 3.慎重投與：

有下列症狀之患者，必須慎重投與。

- a. 冠狀動脈疾患。 d. 鬱血性心不全。  
b. 甲狀腺機能亢進。 e. 糖尿病。  
c. 高血壓症。 f. digitalis中毒。

### 4.副作用：

- a. 循 環 器：有時會出現心悸亢進、血壓變動、顏面潮紅、蒼白等症狀。  
過量的投與時，這些副作用，會強烈的出現這種場合就要中止或是減量。  
b. 精神神經系：有時會出現頭痛、戰慄、不眠、發汗、神經過敏等症狀。

c. 消 化 器：有時會出現噁心，食慾不振，胃部不舒服，腹痛等症狀。

d. 過 敏 症：出現發疹等過敏狀時要中止投與。

e. 其 他：①偶而會發生血痰。

②據動物實驗報告經長期間給予大量連續服藥時Serum Transaminase Value會上升。

③咯痰量會暫時增加，且神經質之病患會有不安的現象。

### 5.對妊婦的投與：

對於妊娠中之投與其安全性尚未確立，所以對妊婦及有妊娠可能之婦人只能在判斷治療上的有益性能把危險性挽回時才能投與。

### 6.相互作用：

應避免與Epinephrine、Isoprenaline等及其它的Catecholamin製劑併用。

7.有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens- Johnson syndrome <SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>)、急性廣泛性發疹性膿疱症(acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>)等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

不良反應：

免疫系統疾患：

罕 見：過敏反應(hypersensitivity reactions)

頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)

皮膚及皮下組織疾患：

罕 見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症)

賦形劑：Colloid Silicon Dioxide、Sunset Yellow FCF、Cellulose Microcrystalline、Potato Starch、Water Purified、Alcohol 95%、Magnesium Stearate

包 裝：6錠，60錠，100錠，500錠，1000錠瓶裝。

100錠，200錠盒裝。

衛署藥製字第022227號 Code. No. TB-03 2211100

藥商：

PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司  
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠：

PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司  
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.  
台南市新營區開元路154號

