衛署藥製字第022461號

僂麻質斯、神經痛治療劑

"壽元" 利克痛注射液

Licoton Injection "S.Y."

【成　　分】：每mL中含：

Sodium Chondroitin sulfate……10mg

Sodium Salicylate……20mg

賦形劑：Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid, Water for Injection

【適 應 症】

老人性神經痛、急慢性僂麻質斯、肋間神經痛、痛風、坐骨神經痛、婦人腰痛、後陣痛、腰痛、關節痛、外傷性神經痛、肌肉痛。

【用法用量】

通常成人1次20mL，1日1次，徐徐靜脈注射（須6分鐘以上），本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1.一般應注意事項：偶有引起休克樣症狀，平時應有急救措施之準備。

2.禁忌：有水楊酸製劑(Aspirin)等及Chondroitin Sulfate製劑之藥物過敏症病歷之患者。

3.須慎重投藥：

a.腎障害患者。

b.Chondroitin Sulfate製劑之使用經歷患者。

c.有藥物過敏症病歷之患者。

4.副作用：

a.過敏症：偶有惡感、戰慄、氣喘發作、發疹蕁麻疹、經斑出現。

b.神經系：偶有冷汗、頭暈、痛頭、催眠倦怠感出現。

c.胃腸：偶有嘔吐現象等，此等現象出現時減量或中止用藥。

d.注射部位：偶有血管痛、發紅、搔癢、腫脹等現象。

e.血液：偶有Prothrombin時間之延長，血小板機能異常之現象。

f.其他：偶有發熱、熱感、浮腫之呈現。

5.相互作用：

a.對抗凝血劑之作用有增強，須慎重投藥。

b.對抗糖尿病用劑(如Sulfonylurea)之作用有增強，併用時，須觀察血糖值，並慎重用藥。

6.妊婦或有可能懷妊之婦人不可使用。

7.使用上應注意事項：使患者橫臥，10～20mL靜注時須3～6分鐘以上。

【包　　裝】

20mL×10A、20mL×50A。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號