“派頓”肝胃腸顆粒

衛署藥製字第 022502 號

Kanweichang Granules “Patron”

【成分】每 gm 中含有：

Scopolia extract----------86.9mg

Aluminum Hydroxide Dried Gel----------173.9mg

Bile extract ox----------69.6mg

Dehydrocholic acid----------7.0mg

【賦形劑】：MENTHOL、SODIUM BICARBONATE、CALCIUM CARBONATE、GLYCINE、TAURINE、GLYCYRRHIZA EXTRACT。

【適 應 症】：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷爲胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、解除脹氣、緩解氣脹相關症狀；幫助消化。。

【用法用量】：成人一次服用一匙(1.15gm)，.一天 3~4 次，或需要時服用；12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次一錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠；3 歲以下嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行服用。

【類　　別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處(25℃以下)。

3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】：1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況使用：

(1) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。

(2) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(3) 制酸劑不得併用其他藥品。

(4) 單次劑量之酸中和能力為 3mEq 以上。

2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

4. 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。

5. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

6. 本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。

【包　　裝】：1000 公克以下塑膠瓶裝。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區爲隨東路 50 號

TEL：(07)6216126