“榮民” 護 膚 星 軟 膏

Fluomycin Ointment “VPP”

本品主成分為 Neomycin Sulfate 及 Fluocinolone Acetonide，Neomycin Sulfate 為藥效優越之外用廣效性抗生素，所含 Fluocinolone Acetonide (6α,9α-difluoro-16α hydroxy prednisolone-16,17-acetonide)，屬合成性糖皮質類固醇(Synthetic Glucocorticoids)，對發炎性、過敏性皮膚炎，極具療效。本品由其兩者配伍，可產生相乘療效。

【主成分】：每公克含

Fluocinolone Acetonide……..0.25 mg
Neomycin (as Sulfate)……5.0 mg (Potency)

本藥品含賦形劑 Tween 60、Beeswax、Benzyl Alcohol、White Soft Paraffin、Propylene Glycol。

【適應症】：過敏性及炎症性皮膚疾患。

【效能】：異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、接觸性皮膚炎、皮脂漏性皮膚炎、濕疹性皮膚炎、皮膚搔癢、鬱滯性皮膚炎、擦爛性濕疹、錢幣形濕疹、剝落性皮膚炎、擦爛性牛皮癬、手術後感染。

【藥理作用】：

本品所含 Neomycin Sulfate 屬於氨基配醣體抗生素(Aminoglycoside Antibiotics)，為廣效性抑制劑，尤其對革蘭氏陰性菌抗菌效果強，於鹼性下作用最強，膿及細胞滲出物，亦不能破壞本品抗菌力。本品所含另一成分 Fluocinolone Acetonide 於結構 C_6, C_9位置上以 F 鹵化，較諸天然性糖皮質醇類固醇(Natural Glucocorticoids)，具更強抗炎性，故使用劑量可以減少，相對地降低其副作用。Fluocinolone Acetonide 0.025%，較 Hydrocortisone 1%相較，則具相同效果。

Fluocinolone Acetonide 由於具抑制細胞液滲出作用，及細胞增殖，並能抑制微血管擴張，故具抗炎作用，又 Fluocinolone Acetonide 使嗜伊紅性白血球(Eosinophil)，及抗體之生成減少，同時抑制 Histidine Decarboxylase 之作用，使組織胺生成減少，故具極佳之抗過敏作用。

【副作用】：

抗生素：

1. 過敏性皮膚炎。
2. 繼發生感染。
3. Neomycin：耳及腎毒性。

類固醇：

(A) 局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

(B) 庫欣症候群(Cushing’s Syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(Secondary Adrenal Insufficiency)，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等。

【注意事項】：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非有醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6. 除非有醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非有醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非有醫師指示，類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

【警語】：

抗生素：

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 長期使用有可能引起繼發性感染。
3. 會使衣物染色。

類固醇：

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

【用法、用量】：**本藥須由醫師處方使用。**

外用；每日 2~3 次，每次使用少量於患部，輕揉塗勻。

【包裝、貯藏】：

1. 本藥應包裝於緊密容器，儲存於陰涼(15~30℃)且孩童不易取得處所，並避免冷凍。
2. 100 公克以下鋁軟管裝。

衛署藥製字第 022633 號

榮民製藥股份有限公司
Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.
447 Chung Shan E. Rd., Sec. 3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.
桃園市中壢區中山東路三段 447 號 電話：(03)4651190