衛署藥製字第022656號

"壽元"利 腸 寧 痙 錠(待克明)

Dicyclomine Tablets "S.Y."

【成　　分】：每錠中含：

Dicyclomine Hcl……10mg

賦形劑:Lactose Monohydrate, Starch, Calcium Stearate, Talc, Polyvinylpyrrolidone K30.

【作　　用】：

由於Atropine樣之向神經性及Papaverine樣之向肌性之雙重鎮痙作用，使平滑肌之痙攣緩解。

【適 應 症】：

下列疾患所引起之痙攣：食道、幽門痙攣、胃炎、胃、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、痙鬱性便秘、膽管、膽囊炎、膽石症、尿路結石。

【用法用量】：

通常成人1次1～2粒，1日3～4次，本藥須由醫師處方使用。

【注　　意】：

1. 禁　　忌：綠內障、前列腺肥大引起之排尿障害，嚴重心疾患等患者。
2. 慎重投藥：
   a)有前列腺肥大之患者。
   b)甲狀腺機能高進症、鬱血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎、及具高溫環境之患者。
3. 副 作 用：
   a)眼：偶有視調節障害、眼內壓、高進等之症狀出現。
   b)精神神經系：偶有頭痛、頭重、頭暈、睡氣、等症狀出現。
   c)消化器：偶有口渴、便秘、嘔吐、腹部膨滿、不快感、鼓腸、食慾不振等出現。
   d)循環器：偶有心悸高進等症狀出現。
   e)過敏症：偶有發疹等過敏症狀出現時，中止用藥。
   f)泌尿器：偶有排尿障害出現。
   g)其　他：偶有倦怠感、脫力感出現。
4. 相互作用：與下列藥劑併用時，可增強本劑之作用。（三環系抗鬱劑，mono amino氧化酵素膽害劑）
5. 其　他：有可能引起視調節障害、睡氣，故本劑服用中之患者不要開動或操作危險性機械。

【包　　裝】：

6～1000錠、5000錠塑膠罐裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號