消化性潰瘍治療劑　　衛署藥製字第 022685 號

“永吉”胃 得 健 錠
（希每得定）

Wergen Tablets “Yung Chi”
（Cimetidine）

胃酸之過度分泌為產生消化性潰瘍之一主因，而組織胺已知為胃酸分泌最強之刺激劑，但一般抗組織胺卻不能拮抗組織胺在胃黏膜的作用。在胃黏膜之組織胺者稱為 H_2-receptor，是生理學者極力研究之一問題，最後被證實 Cimetidine 為這種 H_2-receptor 的拮抗劑，對於組織胺、胃泌素、迷走神經、胰島素、食物、咖啡鹼所引起之胃酸分泌均能有效的控制，也已廣泛的用於治療消化性潰瘍。

【特　徵】

1. 本品能阻斷 Histamine 在胃黏膜之 H_2 接受體作用，對於組織胺、胃泌素、迷走神經、胰島素、食物、咖啡鹼所引起之胃酸分泌均能有效的控制。
2. 為迷走神經阻斷劑，迷走神經切除術可更有效的控制胃酸分泌。
3. 作用確實，副作用殆無，而有 24 小時持續性抑制胃酸分泌效果。
4. 本品可促進胃黏膜之完整性及增強抵抗力。

【成　份】每錠含：Cimetidine----------200mg

【賦形劑】 Lactose、Avicel、Hydroxypropyl Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Tartrazine Aluminum Lake、Magnesium Stearate。

【適應症】胃、十二指腸潰瘍。

【用法、用量】本藥須由醫師處方使用。

1. 胃、十二指腸潰瘍：一日 5 錠，每餐各 1 錠，睡前 2 錠連續服用 4~6 週。
2. 逆流性食道炎：一日 4 次，一次 2 錠，開始治療時可併用制酸劑，至症狀消除後，繼續單獨以本品治療，癒後可以維持量（每天睡前 2 錠或早晚各 1 錠）治療可防止復發。
3. Zollinger-Ellison 症候群：一日 3 次，一次 1~2 錠，睡前再服 2 錠即可有效控制症狀。依年齡症狀適宜增減之。

【包　裝】100 錠盒裝、100、500 錠塑膠瓶裝、1000 錠塑膠罐裝。

永吉製藥股份有限公司
屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號
電　話：(08) 7772291