衛署藥製字第022746號

十二指腸潰瘍、胃潰瘍治療劑

"壽元"壽胃寧錠(希每得定)

Suwelin Tablets "S.Y." (Cimetidine)

【成　　分】每錠中含：

Cimetidine…………………………200mg

賦形劑:Lactose, Starch, Carboxymethylcellulose, Magnesium Stearate.

【作　　用】

本劑不僅可以抑制基本之胃酸分泌，並有效抑制各種刺激所引起之胃酸分泌，及減低胃蛋白□分泌量。其競爭性的抑制組織胺在組織胺H2-感受器的作用，本劑是醫藥新發明的藥物，屬於組織胺H2-感受器的拮抗劑。

【適 應 症】

十二指腸潰瘍、胃潰瘍。

【用法用量】

通常成人一日三次每次1錠，睡時再加服2錠，視症狀適宜增加，最高量可達8錠必須連續服用四週，維持量為2錠於睡時服用或早晚服用。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

腎機能不全的患者，(Creatinine clearance低於30mL/min)劑量需減低，在anephric患者，（或Creatinine clearance低於15mL/min），一天400毫克分兩次服用，循環中Cimetidine level會被血液滲析所降低，因此Cimetidine須於滲析最後階段才服用。

患有惡性胃潰瘍者，應避免使用本劑治療，因本劑亦會減輕惡性胃潰瘍之症狀，如此會延誤診斷治療。

【副 作 用】

治療期間，有少數患者有暫時的下痢、疲倦、暈眩、發疹現象的報告。少數男性病人有輕微的乳房增殖現象、在繼續服藥期間，此症狀可能不變或恢復正常。極少數腎機能不全或腦綜合病症的老年人或重症患者，有輕微精神混亂的現象發生，但停藥後24小時內恢復正常。

Plasma creatinine少量增加，此現象不會因繼續服用而增強，治療結束症狀消失，有些血中transaminase增加，少數呈現間質性腎炎，停藥後症狀會消失。

【包　　裝】

100錠、500錠、1000錠瓶裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號

_Aode No.
748字第04224
號aGMP・G-6287

"壽元" 壽胃寧 錠400毫克(希每替定)

Suwelin Tablets 400mg (Cimetidine)

份】：Each tablet contains:

Cimetidine‥‥‥‥‥‥‥‥‥400mg

：【作　　用【
　、胃潰瘍　本劑不僅可以抑制基本之胃酸分泌，並有
酶
抑制各a　　種刺激所引起之胃酸分泌，及減低胃蛋白
分泌量a　　。其競爭性的抑制組織胺在組織胺H2感受
的作用a　　，本劑是醫藥新發明的藥物，屬於組織胺H
感受器a　　的
抗劑。a【適 應
。症】：a　　十二指腸潰瘍
：】用法用量【
。用本　　每日兩次，每次一錠，於早上飯後及睡前服
　藥須由醫師處方使用。

項　於a事

：a　　腎機能不全的患者，（Creatinine clearance

٣٠mL/min）劑量需減低，在anephric患者，（或
Creatinine clearance低於15mL/min），一天400毫克分兩次服用，循環中Cimetidine level會被血液滲析所降低，因此Cimetidine須於滲析最後階段才服用

症之如此會延誤診視治療，a　　患有惡性胃潰瘍者，
避免使用本劑治療，因本劑a　　亦會減輕惡性胃潰瘍

【副 作 用】

治療期間，有少數患者有暫時的下痢、疲倦、暈眩、發疹現象的報告。少數男性病人有輕微的乳房增殖現象，在繼續服藥期間，此症狀可能不變或恢復正常。極少數腎機能不全或腦綜合病症的老年人或重症患者，有輕微精神混亂的現象發生，但停藥後24小時內恢復正常。Plasma creatinine少量增加，此現象不會因繼續服用而增強，治療結束症狀消失，有些血中transaminase增加，少數呈現間質性腎炎，停藥後症狀會消失。

【包　　裝】
。　4-1000錠鋁箔金屬膠瓶裝

學工業股份有限公司

民路١٢٨號