


“優良”胃去病錠 200 (希每得定)  
 300 毫克 (希每得定)  
 400 200 (CIMETIDINE)  
**GASTRODIN TABLETS** 300 mg (CIMETIDINE)  
 400 (CIMETIDINE) “ULIANG”

“優良”胃去病之主成分 Cimetidine 為組織胺 H<sub>2</sub> 接受體拮抗劑，化學上為 N'-Cyano-N-methyl-N'-[2-[[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-guanidine，其結構式為：



Cimetidine 為無色之結晶，微苦，稍有異味，可選擇性地抑制組織胺作用在胃壁細胞中之 H<sub>2</sub> 接受體上，因此在藥理上，它是一種創新作用的藥物，稱為組織胺 H<sub>2</sub> 接受體的阻斷劑。

“優良”胃去病不是一種膽素激導性阻斷劑 Anticholinergic agent，研究顯示“優良”胃去病可抑制白天及夜間的基本胃酸分泌，提高胃內酸鹼值而降低胃蛋白酶的排出量，同時抑制因食物、組織胺、咖啡鹼、胰島素及胃泌素等所引起刺激胃酸的分泌。

【成分】：每錠含

Cimetidine.....200mg, 300 mg 或 400 mg

【作用】：

“優良”胃去病錠口服後，迅速吸收，45 至 90 分鐘可達最高藥效，半衰期約為 2 小時，口服 300 mg 錠劑，可百分之百抑制基礎胃酸分泌達 2 小時以上。空腹之十二指腸潰瘍患者服用本品，可抑制胃酸分泌超過 90 % 達 4 小時以上。患者服用本品，其胃液之 pH 值增至 5 以上，長達 2 小時以上。“優良”胃去病錠可使頑強難治的潰瘍傷口癒合，十二指腸潰瘍患者空腹睡前服用本品 300 mg 劑量，可百分之百的抑制基礎胃酸分泌 1 小時以上；更可維持抑制胃酸分泌 89 % 以上，長達 7 小時之久。實驗得知，十二指腸潰瘍患者飯後 1 小時，服用本品 300 mg 劑量，可抑制胃酸分泌 50 % 以上；飯後 2 小時，本品可抑制胃酸分泌 70 % 以上。服用本品，因胃液分泌量減低，而使胃蛋白酶的分泌減低，亦使部分胃內在分子濃度減低。服用本品後，大部由尿中排出，口服後，其代謝產物為 Sulfoxide，口服單劑量 24 小時後，其總排泄量的本體出現可達 48 %。

【適應症】：

錠劑：胃潰瘍、十二指腸潰瘍及因胃酸過多引起之諸症。

【用法用量】：

口服：一般劑量是每日四次，每次 300 mg 餐後及睡前服用，胃及十二指腸潰瘍患者可併服制酸劑以減除疼痛。服用本品後，潰瘍部位常在一、二星期內即有癒合現象，即使症狀很快即獲得緩解，仍需連續治療四至六星期。病理上的胃酸分泌過盛(如 Zollinger-Ellison Syndrome)，劑量可依患者病情調整，通常每日劑量不超過 2400 mg，且需延長治療時間，胃臟嚴重受損者每八小時或十二小時服用 300 mg。本藥須由醫師處方使用。

【副作用】：

1. 約 1% 的患者服用“優良”胃去病錠會發生輕微的腹瀉、肌肉痛、暈眩、藥疹等。
2. 連續服用 1 個月以上，極少數患者發生女樣男乳，但無內分泌不正常的現象，若繼續服用“優良”胃去病錠，症狀會保留原狀或恢復正常。
3. 偶爾發生血中肌氨酸或氨基轉移酶值升高現象，略呈發燒或間質性胃炎，但停藥後，症狀即消失。

【注意事項】：

1. 服用本品所產生的症狀緩解，不會掩盖胃癌的症狀。
2. 本品與 Warfarin 類抗凝血藥物合用時，會加強抗凝血作用。
3. 本品尚無使用於孕婦的經驗，但動物實驗顯示 Cimetidine 會通過胎盤障壁。以老鼠及兔子作催眠性試驗，發覺用 Cimetidine 並不影響生育力，也不傷害胎兒。
4. 授乳婦使用本品，可能由母乳中排出，故避免授乳。
5. 經醫師允許，本品可用於兒童，曾使用的劑量是每日每公斤體重 20~40 mg。

【賦形劑】：

Lactose, Corn Starch, Povidone K-30, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Melon shade B.

【包裝】：

“優良”胃去病錠 200 毫克、300 毫克(希每得定)：  
 4、10 粒盒裝，100、500、1000 粒瓶裝。

“優良”胃去病錠 400 毫克：  
 4-1000 錠瓶裝、鋁箔盒裝。

“優良”胃去病錠 200 毫克(希每得定)

“優良”胃去病錠 300 毫克(希每得定)

“優良”胃去病錠 400 毫克

衛署藥製字第 022903 號

衛署藥製字第 022902 號

衛署藥製字第 031728 號

【委託者】:



優良化學製藥股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

【製造廠】:

健喬信元醫藥生技股份有限公司

健喬廠 303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

SPLT0030