

LOT :
MFD :
EXP :



拿可欣[®] 膠囊100毫克 (本補麻隆)
Narcaricin[®] capsules 100 mg
(Benzbromarone)

Each capsule contains :
Benzbromarone..... 100 mg

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號

適應症：
痛風、高尿酸血症。
衛署藥製字第 022964 號

用法用量：
本藥須由醫師處方使用。
請詳閱說明書後使用。
請詳閱說明書。

瑞士藥廠股份有限公司
衛署藥製字第022964號

瑞士藥廠股份有限公司
衛署藥製字第022964號

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |
|  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |
|  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |
|  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |
|  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |  拿可欣 [®] 膠囊100毫克 (本補麻隆) Narcaricin [®] capsules 100mg(Benzbromarone) |



For lowering
increased serum uric acid level
Narcaricin[®]
cap.
(Benzbromarone)

100mg.
拿可欣[®]
膠囊
(本補羅隆)

痛風、高尿酸血症。

PIC/S GMP 綜合藥廠
瑞士藥廠股份有限公司
新市廠: 台南市新市區中山路182號

總經理
惠欣國際有限公司
高雄市中區建業路119號
電話: (07)3867252

用法用量：
通常成人每日口服一
次(100mg)於一八天後
可漸正常尿酸代謝量。
如劑內含有其他代劑。
可在每日口服(100mg)
或(200mg)。服中藥
劑應注意與血液尿酸
一併服用。本藥之
劑應每日服用。
注意：服用
請詳閱說明書後服用。

100mg.
Narcaricin[®]
cap.
(Benzbromarone)
For lowering
increased serum uric acid level

Ⓜ



For lowering
increased serum uric acid level
Narcaricin[®]
cap.
(Benzbromarone)

100mg.

100caps

成分：
Each capsule contains
Benzbromarone 100mg
總重量：100mg (100mg)
適應症：痛風、高尿酸血症。
適應症：痛風、高尿酸血症。
AS-2014-01
地址：高雄白晝及有效
日期如下請詳閱