


7106 11/6

# 成藥藥品仿單標籤粘貼表

藥品名稱	"西德有機"達胃明錠	申廠	請商	西德有機化學藥品股份有限公司
衛生署 給證號碼	衛署製字第D23020號			



<div style="text-align: center; padding: 10px;">  <p><b>達胃明錠</b> 200公絲 (希得定)</p> <p><b>TAWEIMIN TABLETS</b> 200mg (Cimetidine) "SHITEH"</p> <p>成 份：每錠含 Cimetidine ..... 200 mg</p> <p>用法：本劑屬於組織胺H<sub>2</sub>-感受器的拮抗劑，其競爭性的抑制組織胺在組織胺H<sub>2</sub>-感受器的作用，不僅可以抑制基本之胃酸分泌，並有效抑制各種刺激所引起之胃酸分泌，及減低胃蛋白酶分泌量。</p> <p>本劑口服後，吸收迅速。其半衰期約2小時，主要經由尿液排泄。</p> <p>適應症：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃腸道出血及胃泌素瘤候群。</p> <p>用法用量：            1. 十二指腸潰瘍及良性胃潰瘍：一天5錠（早午晚餐各1錠，睡前2錠），連服4~6週。            2. 消化性食道炎：每天4次，每次2錠（400mg），餐前及睡前服用，連服4~8週。            3. 出血性潰瘍：一天5錠（早午晚餐各1錠，睡前2錠），必要時可增加劑量至早午晚餐及睡前各2錠。因本劑可能無法在開始時立刻使症狀解除，因此開始時與制酸劑可合用，直到疼痛消失為止。            4. Zollinger-Ellison症候群：每天三餐時各1~2錠，即可有效控制症狀。</p> <p>【注意事項】：            1. 腎機能不全患者，劑量需減低，在Anephric患者，1天400mg，分兩次服用。循環中，Cimetidine Level會被血液滲析所降低，因此Cimetidine須於滲析最後階段才服用。            2. 患有惡性胃潰瘍者，應避免使用本品，因本品亦會減輕惡性胃潰瘍之症狀，如此會延誤診斷治療。            3. 使用Warfarin型的抗凝血劑的患者，同時服用本劑發現會使Prothrombin time延長。故當此兩種藥物同時服用時，抗凝血劑的劑量須減低。            4. 懷孕或泌乳患者，於動物試驗中並未發現任何危險，研究顯示本劑在動物中能通過胎盤及分泌於乳汁中，故除非必要，否則在懷孕期及泌乳期最好不要使用本劑。            5. 副作用：少數患者有暫時的下痢、疲倦、暈眩、發疹現象的報告。少數男性病人有輕微的乳房增殖現象，在繼續服藥期間，此症狀可能不變或恢復正常。極少數腎機能不全或腦綜合病症的老年人或重症患者，有輕微精神混亂的現象發生，但停藥後24小時恢復正常。</p> <p style="text-align: right;">Plasma Creatinine 小量檢測：此項尚未有確切</p> </div>	<p>適應症： 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃腸道出血及胃泌素瘤症候群。</p> <p>用法用量：請參照說明書的指示使用。</p> <p>(1)十二指腸潰瘍及良性胃潰瘍：一天5錠(早午晚餐各1錠，睡前2錠)，連服4~6週。</p> <p>(2)消化性食道炎：每天4次，每次2錠(400mg)，餐前及睡前服用，連服4~8週。</p> <p>(3)出血性潰瘍：一天5錠(早午晚餐各1錠，睡前2錠)，必要時可增加劑量至早午晚餐及睡前各2錠。因本劑可能無法在開始時立刻使症狀解除，因此開始時與制酸劑可合用，直到疼痛消失為止。</p> <p>(4)Zollinger-Ellison症候群：每天三餐時各1~2錠，即可有效控制症狀。</p> <p>注意事項：請詳閱說明書後使用。</p> <p>衛署藥業字第D23020號</p> <p>批 號：</p> <p>製造日期：</p>
--	--

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛生署標準書表

Nº 052002