"應元" 眩暈糖衣錠

Cephen S.C. Tablets "Y.Y."

【成分】Each S.C. tablet contains：


Diphenidol HCl.....25mg

賦形劑：

Lactose, Cellulose microcrystalline, Sodium starch glycolate, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Dibasic calcium phosphate hydrate, Sucrose, Talc, Gelatin, Acacia, Titanium dioxide, Carnauba wax powder, Purified water

【化學式】

1.1-Diphenyl-4-piperidine-1-butanol hydrochloride



【作用】

1. 改善椎骨腦底動脈之循環不全一本品對患側椎骨動脈之血管攣縮，具有選擇性緩解作用，能除去患側與健側之血流量不平衡現象。
2. 調整前庭神經路之機能一本品能在前庭神經核 Level 遮斷由末梢前庭神經進入之異常刺激，更能在高位前庭性視床下部抑制刺激之傳達。
3. 抑制異常眼振。
4. 抗攣縮血管作用。

【適應症】

因內耳障礙引起之眩暈(包括腦血管障礙及頭頸部外傷後遺症之眩暈)美尼艾氏症候群。

【用法用量】

1 天 3 次，每次 1~2 錠。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】

1. 本品對患腎機能嚴重障礙者不宜使用。
2. 對藥物過敏者及線內障之患者不宜使用。
3. 使用本品若有口渴、胸部灼熱感、散瞳、頭痛、發疹、動悸等現象，應立即停藥。
4. 孕婦避免使用。

【貯存】

請置於 25℃以下貯存。

【包裝】

6~1000 錠以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06)2654883（代表號）