

利胃健錠(匹雷辛平)

Lizepine Tablets “LITA” (Pirenzepine dihydrochloride)

【成分名】 Pirenzepine

【劑型、含量】 錠劑、每錠含：

主成分：Pirenzepine dihydrochloride.....25mg

賦形劑：Corn Starch、Lactose、Povidone、Magnesium Stearate

【臨床藥理】

Pirenzepine 藉由選擇性 Antimuscarinic 之拮抗作用來降低胃酸的製造，是一專一性的胃分泌抑制劑。在臨床療效下並不會有阻斷酸分泌及腸胃之正常生理功能。

【適應症】

胃潰瘍及十二指腸潰瘍、胃炎、胃酸過多、胃分泌瘤綜合症候群。

【用法用量】

建議每日劑量 50~150mg 於早、晚分兩次服用，有些時候在開始 2-3 天可增加劑量，每日分三次劑量。依症狀服用 4~6 週，若有需要可持續至三個月。飯前半小時至一小時服用。不可隨意減量或停藥。嚴重腎臟功能不好之病患必須調整劑量。高齡患者會有較顯著之藥理反應須注意減量。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 一、會引起眼睛調節障礙之疑慮，故服用本製劑之患者，請勿從事開車等有危險性之機械操作。
- 二、高齡患者需注意減量。
- 三、懷孕期投與之安全性尚未建立，避免使用於懷孕初期。
- 四、授乳婦投與時請勿授乳。
- 五、小兒之安全性尚未建立。
- 六、對於腎功能不全者須降低劑量。

【禁忌症】

對本品產生過敏反應者、前列腺肥大者、痙攣性腸隔、幽門狹窄、窄角性青光眼。

【交互作用】

- 一、併用 H2-阻斷劑會增強抑制胃酸作用。
- 二、併用 Caffeine, alcohol 時，會降低 Caffeine, alcohol 刺激胃酸分泌作用。與 Antacids(含 calcium/magnesium), Carbonic anhydrase inhibitors, Citrates 或 Sodium bicarbonate 併用時，會因尿液鹼化而延遲排除，易導致副作用的產生。
- 三、與吸附性止瀉劑併用會降低藥效。
- 四、與 Haloperidol 或 Ketoconazole 併用，則因減少吸收而降低此二者療效。
- 五、與 Metoclopramide 併用時因時作用互相拮抗而降低 Metoclopramide 療效。

【副作用】

與劑量有關且間有口乾、便秘、視覺模糊、齒肉痛、腹脹感、發疹、眼睛乾燥、尿滯留、頭重、站立暈眩、無力感等。心跳過快較為罕見。曾有顆粒性白血球缺乏及血小板減少案例報告。

【貯存】 避免陽光直射，貯存於室溫。

【包裝】 瓶裝。

衛署藥製字第 023532 號



利達製藥

利達製藥股份有限公司

LITA PHARMACY CO., LTD.

台中市大甲區中山路一段 906 號 消費者服務專線 04-26872345



4 711457 270453