# 鬆 肌 痛 錠

Sotilon Tablets

成份:Each tablet contain: 賦型劑

Acetaminophen…… 450mg Lactose…….... 50mg Starch……35mg

Chlormezanone …… 100mg Sodium Lauryl Sulfate 5mg Magnesium Stearate……..6mg Talc…….4mg..

作用：本品為骨骼鬆弛劑 Chlormezanone 與 Acetaminophen 配合，可解除焦慮、緊張、痙攣引起之疼痛。

適應症：肌肉痙攣、疼痛、溫和焦慮及緊張狀態。

用法用量：成人每日 3 次，每次 1-2 錠。本藥須由醫師處方使用。

**警語：1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時應停藥並就醫。**

**注意事項：**

**1.本劑應確實按照所定服用方法及劑量使用。 2.本劑應置於小孩伸手不及處。**

**3. 應用本劑數次，仍未見症狀改善時，應即停用，並避免長期服用。**

**4. 在就診中尚使用其他解熱鎮痛或感冒製劑，應避免重覆使用。**

**5. 極少數引起多形性紅斑(Erythema multiforme)Stevens- Johnson 症狀群和毒性皮膚壞死(Toxic epidermal necrolysis)。**

**6. 曾患過過敏症之患者應禁止使用，發疹、浮腫、紅潮等之過敏出現時應停藥。**

7. 對於肝腎障礙患者應慎重使用，有黃疸出現時要停藥。

8. 有腫氣、眩暈、運動失調、頭痛、頭重感、脫力感、倦怠感或霧視等症狀出現時應減量或停藥。

9.孕婦及授乳婦應注意使用。

10.酒精警語：若你每天喝三杯或更多之酒精飲料，請詢問你的醫師你是否能服用本品或其他鎮痛劑，因為本品可能造成肝損害及胃出血

警語及注意事項：加刊

(一) 肝毒性：1.使用 **Acetaminophen**(Paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 **Acetaminophen** 所致，且多涉及使用超過一種以上含 **Acetaminophen** 成分之藥品。

2.過量服用 **Acetaminophen** 可能是因想要穫得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 **Acetaminophen** 成分之藥品，因而造成用藥過量。3.有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 Acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 **Acetaminophen** 或 Paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 **Acetaminophen** 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 **Acetaminophen**，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(二)與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 **Acetaminophen** 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 **Acetaminophen** 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三) 過量：1、服用過量 **Acetaminophen** 會在 **24** 小時內看到初期症狀，包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。2、本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。3、**Acetaminophen** 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48-72 小時才明顯可見。

(四)過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 **Acetaminophen** 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 **Acetaminophen** 過敏的病人，亦

應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(五)嚴重皮膚反應：使用 **Acetaminophen** 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病**(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis,AGEP)** 、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome,SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis,TEN) 。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

包裝：6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。 衛署藥製字第 023597 號

委託者：峰揚新生技有限公司 地址：彰化縣彰化市平等街 13 號 1 樓

製造廠：正長生化學製藥股份有限公司 廠址：彰化縣和美鎮彰美路二段 6 號