衛署藥製字第023628 號

胃及十二指腸潰瘍治療劑

〝政德〞胃健平**注射液**(匹雷辛平)

GASPIN Injection "Gentle" (Pirenzepine)

Gaspin 能阻斷胃壁細跑的Acetylchline receptor 它具有顯著的胃酸分泌抑制作用。臨床上顯示Gaspin 具有選擇性的作用，對胃粘膜的Muscarinic receptor 具有專一性的高度結合力，從而減少胃液分泌同時又不干擾其他的Muscarinic 功能如眼、心臟、唾液腺、胃腸平滑肌及其他低親和力的結合部位。Gaspin 不通過Blood Brain Barrier 因此對CNS 沒有作用係謂專一性的Muscarinic 拮抗劑，在治療劑量下使用時無一般抗膽素劑的副作用。本品安全性高，無不良副作用，可迅速而完全地解除疼痛，平均治療期間僅四至六星期，本品半衰期甚長，可持續10小時以上。

成分: 每m L 含

主成份：

Pirenzepine dihydrochloride ……5mg

賦形劑：

E.D.T.A

Sodium Chloride

Water for injection add to

適 應 症：預防及治療緊張性潰瘍，出血性胃糜爛、上胃腸道潰瘍，胃泌素瘤綜合(Zollinger-Ellison)症候群，嚴重性急慢性胃及十二指腸潰瘍。

用法用量：通常每12 小時注射一安瓿(2ml)行肌肉或靜脈注射。預防及治療手術後緊張性潰瘍，每隔8 小時注射一次，嚴重症狀可高至一次二安瓿，一天三次，症狀消失後須再持續2~3 天的治療。本藥限由醫師使用。

注意事項：

1. 在高劑量下仍未顯示有畸形胎發生，但是在懷孕前三個月最好避免使用。
2. 無抗膽素劑的副作用，在治療劑量下使用時不必顧慮到這類藥品的禁忌症。
3. 極少數的病例可能會發生軟便，口乾或視力調節障礙。
4. 有時會降低由某些食物及藥物如酒精、咖啡因等刺激引起之胃酸分泌。
5. 併用H_2-receptor blockers 治療可以更顯著的減少胃酸分泌。
6. 併用消炎劑時其作用不會被損害，相反的可以改善這些製劑的胃腸耐受性。

包　　裝：2ml×10A, 2ml×50A, 2ml×100A。

政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號