

“福元”匹洛康膠囊10公絲(匹若卡)

Pyrocam Capsules 10mg “F. Y.” (Piroxicam)

本劑是非類固醇抗炎劑，同時具有止痛和退熱的作用。

衛署藥製字第23901號

現在已知此藥並不刺激腦下垂體一腎上腺系統。

此藥在口服之後很容易吸收，禁食狀態不影響吸收的程度和吸收的速度。此藥在人體血漿內的半生期為36～45小時，每天服用一次即可在全天中保持穩定的血漿中濃度，連續服用5至7日後，血漿中濃度可到達一穩定狀態，以後長期服用，此濃度也不再增加。

此藥被代謝得很徹底，每天不到5%的劑量以原形由糞尿中排出。

此藥容易和蛋白質結合，所以會排斥其他與蛋白質結合的藥。體外實驗顯示，它不會排斥雙香豆素(dicoumarol)。但病人使用香豆素類抗凝固劑和其他容易和蛋白質結合的藥物，又使用此藥時，醫師必須特別注意調整各藥的劑量。

人體內研究顯示，病人同時使用此藥和阿司匹林，並不影響各藥在血液中的治療濃度，這一點和其他非類固醇抗炎劑不同。

[成 分]：每膠囊中含

Piroxicam 10mg

[適 應 症]：類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)。僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風。

[禁 忌 症]：從前已對此藥過敏的患者，不能再使用。

[警 告]：對孕婦：

雖然動物實驗沒有顯示此藥有促成畸胎的作用，但孕婦、授乳婦使用此藥是否安全，仍不確定。此藥作用於前列腺素合成酶，所以會抑制前列腺素的合成和分泌。其他非類固醇抗炎劑的此類作用已知與吃此類藥的懷孕動物的難產與延遲分娩有關。。

對兒童：

兒童在何種情況下可服用此藥，其劑量如何等等問題均未確定。

[注意事項]：服用此藥有時會引起消化性潰瘍或胃腸出血。從前已有胃腸病的人服用此藥時要特別注意。

少數病人在服用非類固醇抗炎劑(包括此藥)時，會有血中尿素氮增加的現象。使用此藥時，這種增加會止於一定的限度。停止服藥就會恢復正常。血中尿素氮的增加和血清肌酸量的增加無關。

[不良反應]：胃腸症狀是最常見的副作用，但大致不會影響治療。每天服用20公絲(分成一次或多次服用)胃腸所受的刺激比吃阿司匹林還小。長期每天服用30公絲以上的比較容易發生胃腸方面的副作用。

除了胃腸症狀以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫。一般常規檢眼鏡檢查和隙燈檢查，都不能發現病人眼睛有什麼變化。

有人發生與胃腸出血無關的血紅素或血球容積的減少。

有人曾經發生肝機能的變化，大多數非類固醇抗炎劑，都會使一部份病人的血清轉胺基酶量(SGPT)增加。

[過 量]：服用過量時，可對病人使用支持及對症療法。

[用法・用量]：(1)類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：

初劑量可用每天20公絲用一次。大多數病人的維持量也是每天20公絲，有些病人的維持量是每天30公絲，分成一次或幾次使用。少數病人的維持量可以減少到每天10公絲，長期服用每天30公絲以上的劑量，會增高胃腸副作用發生可能性。

(2)急性肌肉骨骼損傷：

最初兩天給予每日40公絲，分成一次或幾次服用，然後每天服用20公絲，全部治療期間是七到十四天。

(3)急性痛風：

最初每天一次40公絲，然後每天給予40公絲，持續4到6天，每天分成一次或幾次服用。痛風病人不能長期服用。

本藥須由醫師處方使用。

[包 裝]：100粒、200粒、500粒、1000粒瓶裝。

福元化學製藥股份有限公司

台北縣瑞芳鎮大寮路95—1號