衛署藥製字第024004號

“培力”佈即芬錠

Bugifene Tablets ”P.L.”

【成　　分】有效成分及含量：**每錠中含有Buclizine 2HCl 25mg**
其他成分(賦形劑)：Lactose, Potato Starch, Sodium Starch Glycolate, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate

【用途(適應症)】

用途(適應症)	
抗過敏劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。
鎮 暈 劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【使用上注意事項】

1.有下列情形者，請勿使用：
- a.曾因本藥成分引起過敏的人。
- b. 本劑對孕婦為禁忌(孕婦禁用)。

2.有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
- a.12歲以下。
- b.嚴重代謝性肝腎疾病的人。
- c.曾診斷有下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟病。
- d.有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、青光眼及因前列腺肥大引起排尿困難的人。

3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
- a.可能懷孕婦女及哺乳婦。
- b.65歲以上。
- c.接受醫師治療並服用藥品的人。
- d.服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- e.服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- f. 服用本藥若有不了解之處。

4.其他使用上注意事項：
- a.為防止兒童誤食請妥善保管。
- b.避免陽光直射。
- c.勿超過建議使用量。
- d.不得與酒精性飲料併用。
- e.可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

年齡 / 用途(適應症)	成人及12歲以上	5歲以上未滿12歲
抗過敏	一日1至3次，每次間隔4小時以上服用。1次1-2粒。	每次半粒至一粒。
預防暈車、暈船、暈機	搭乘前30分鐘，一次2粒，一天一次。	

【警　　語】

1.服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	思睡、倦怠感、興奮。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其 他	頭痛、 臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便祕及下痢、視覺上之困擾。

2.服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- a.若有任何不適情況產生。
- b.連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包　　裝】1000錠以下鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲　　存】25°C以下，於原包裝儲存。

委託者：**培力國際醫藥股份有限公司**
地址：407台中市西屯區工業區六路13號1樓
電話：04-23581516(代表號)

製造廠：**培力藥品工業股份有限公司**
地址：407台中市西屯區工業區六路11號
電話：04-23592576(代表號)