



Picol Picol Picol Picol Picol Picol

“皇佳” 保康 膜衣錠 (匹培咪迪)

Picol F.C.Tablets “Royal” (Pipemidic Acid)

本品為一新型的化學性抗菌劑，非抗生素也非磺胺劑，對於 G(-)菌和部分的 G(+)菌均具有極優異的殺菌作用，而且和一般的抗生素及磺胺劑不產生交叉耐藥性，臨床上對於各種泌尿系統、腸膽道的感染，以及鏡檢或導尿引致感染之預防和治療，均有卓越之功效。

〔主 成 分〕：每錠含有：

Pipemidic Acid Trihydrate 293.8mg eq to pipemidic acid..... 250 mg

〔賦 形 劑〕：Com starch、PVP K90、Primojel、Mg. stearate、HPMC 606、PEG 6000、Titanium Dioxide、Food color yellow No.4 lake、Castor oil、Polishing wax-103。

〔藥理特點〕：

1. 抗菌範圍：

本品對於下列菌屬均有優異的殺菌作用—

綠膿桿菌(Pseudomonas)	大腸菌(E. coli)	變形桿菌(Proteus)
克雷白氏桿菌(Klebsiella)	腸內桿菌(Enterobacter)	枸橼桿菌(Citrobacter)
志賀氏菌(Shigella)	沙門氏菌(Salmonella)	沙雷氏菌(Serratia)

及部分的 G(+)菌：如 Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis.

2. 本品殺菌作用機序為抑制細菌 DNA 之合成。

3. 本品經口投與後，由消化道吸收，除了腦和脊髓以外之組織均廣泛分佈，移行濃度較高之組織為肝、消化道、腎及膀胱。其排泄主要以原型大部分由尿中排出體外，而不被代謝。

4. MIC 值：對於一般 G(-)菌為 1.56—6.25mcg/ml，綠膿桿菌為 6.25—12.5mcg/ml，而對於 Nalidixic acid 和 Piromidic acid 有抗藥性之菌屬則為 12.5—25mcg/ml。

5. 藥理生物試驗：成人 500mg 一次投與，一小時後達到血中最高濃度(平均約 4.4mcg/ml)於 2~4 小時內達到尿中最高濃度(平均約 1100mcg/ml)，於 24 小時後約有 88% 之尿中累積回收率。

6. 本品和抗生素、磺胺劑及其他化學性抗菌劑，均沒有交叉耐藥性，對於上述無效之症例，本品亦能獲致滿意的效果。

〔適 應 症〕：

由綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌、腸內桿菌、枸橼桿菌、赤痢菌、腸炎弧菌所引起的腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、腸炎、細菌性赤痢、中耳炎、副鼻腔炎。

〔用法用量〕：

通常成人一日 500~2000mg 分三~四次服用，中耳炎 1500~2000mg 分三~四次服用。

本藥須由醫師處方使用。

〔注意事項〕

- 曾有使用本劑而產生過敏症狀之病歷者，不要使用本劑。
- 有嚴重腎障礙的患者，應慎重服用本劑。
- 副作用
 - (1)過敏症：有時候會有發疹、蕁麻疹、搔癢感、發熱等過敏症狀發生，如此症狀發生時，應終止服用本劑。
 - (2)腎 臟：有時會有 BUN、血中 Creatinine 上昇。
 - (3)肝 臟：有時會有 S-GOT, S-GPT 上昇。
 - (4)胃 腸：有時會有食慾不振、嘔心、嘔吐、胃部不快感、膨滿感、胃痛、下痢、便秘等症狀發生。
 - (5)血 液：有時會有白血球減少發生，故應仔細觀察，若有異常現象發生，應中止服用本劑。
 - (6)其 他：有時會有眩暈、偶而會有頭痛、頭重、全身倦怠感、口渴、口內炎發生。曾因有慢性腎不全而使血中及骨髓液內濃度升高、痙攣發作發生之病例。
- 對於臨床檢查值得影響

因為測定法之故，有時尿蛋白會呈現高值(其實不然)：false high value of urine protein，因此請用煮沸法或試紙試驗法測定之。
- 對於小孩之投藥

對於小孩之服用本劑，其安全性未予確立，故小孩應避免服用本劑。
- 妊婦、受乳婦之服用本劑

對於妊婦及授乳婦之服用本劑，其安全性未予確立，故孕婦，有懷孕之疑的婦女及授乳婦，應避免服用本劑。
- 其他

用幼犬做實驗的結果，有關節異常之例發生。

〔包 裝〕：60, 100, 600, 1000 錠瓶裝。60, 100 錠盒裝。



皇佳化學製藥股份有限公司

ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.

高雄市鳥松區松埔路一巷1號電話：(07)7310537

傳真：(07)7310538