“合誠” 立保停錠 1公絲

Lepotin Tablets 1mg（Clemastine）

Lepotin Tablets其藥理作用如下：

有持續性的抗組織胺作用：能抑制組織胺所引起的諸多過敏性疾病。其持續作用達10~12小時之久。

成　　分：Each tablet contains：

Clemastine Fumarate.....1.34mg

eq.to Clemastine.....1mg

賦 形 劑：Lactose、Starch、Tartrazine、Magnesium Stearate、Talc

適 應 症：

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

用法用量：

一日2次，每次一錠。

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。

3歲以下嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

一、爲防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警　　語：

一、服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。

二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。

四、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。

五、老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。

六、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。

七、服用本藥不得與酒精性飲料合用。

八、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

九、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

十、連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。

十一、不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。

十二、使用於12歲以下之患者前，請先詢問醫師。

許可證字號：衛署藥製字第024921號

包　　裝：100T、500T、1000T瓶裝。

合誠化學製藥股份有限公司

桃園市平鎮區工業十路15號