

縮 蘋 酸 氣 菲 氨 明 錠

Chlorpheniramine Maleate Tablets 4mg “W.P.”

本品為抗組織胺劑，對緩解過敏相關症狀有效。

【主成分】：每錠含有：

Chlorpheniramine Maleate.....4mg

【賦形劑】：Lactose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Cellulose Microcrystalline

【適應症】：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【用法用量】：一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶有興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症者不得服用。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議服用。
6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

【包裝】：6-1000 錠塑膠瓶裝。

【儲存條件】：存放於室溫（25°C 以下）乾燥地方。

衛署藥製字第 025214 號



PIC/S GMP 華盛頓製藥廠股份有限公司

高雄市仁武區工業二路 12 號

07-3711471