十全藥品

衛署藥製字第025243號

"十全"益爾生錠1.5公絲(待赫果信)

Ergoxin Tablets 1.5mg "S.C."

(Dihydroergotoxine mesylate)

【成分】：Each tablet contains:

Dihydroergotoxine mesylate…… 1.5mg

【臨床藥理】：

1.Dihydroergotoxine mesylate的作用機轉尚不清楚，可能為在中樞減少血管緊張度及減少心跳並阻斷了週邊α接受體，另一可能機轉為影響神經細胞代謝，進而改善了氧氣的攝取，及改善了腦部代謝而使抑制性神經傳導量正常。

2.藥物動力學：本品口服吸收率約百分之二十五，半小時至一小時半之後達到最高血漿濃度。由於首渡效應所致，生體可用率約在百分之五至十二之間。分佈體積為1100公升，約16公升/公斤，百分之八十一與血漿蛋白結合。它的排除為雙相式，α相的半衰期較短，為1.5至2.5小時，β相半衰期較長，為13-15小時。主要經由膽汁排入糞便中。經由尿液排除的量約百分之二，包括原形藥及其代謝產物，原形藥少於百分之一。總廓清率為每分鐘約1800公撮。老年病人的血漿濃度略高於年輕人。由於僅有一部份的藥品及其代謝產物經由腎臟排除，因此腎功能不全的病人通常不需要減少劑量。

【適應症】：老人痴呆之輔助治療。

【用法用量】：本藥須由醫師處方使用。

口服劑：每日服用3至6mg，分次服用，最好在飯前服用。

【注意事項】：

【禁忌】：已知對本藥過敏者。

【注意】：1.在出現嚴重心動過緩時，須注意。必須將Dihydroergotoxine mesylate置放於孩童拿不到的地方。

2.低血壓、急發性精神疾患服用本品須衡量危險性與效力。

3.過量處理：目前尚無因服用過量而產生嚴重症狀之病例。

【副作用】：偶爾會發生鼻塞、短暫性噁心以及胃部不舒服，但通常在用餐時服用即可避免。大多數病例，不須採行特別的措施，副作用即會自動消失。

【儲存條件】：儲存於30℃以下(最好為15～30℃)密閉容器避光貯存。

【賦形劑】：Lactose, Starch, Magnesium Stearate, Starch Pregelatinized.

【包裝】：10～1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

十全實業股份有限公司

公司：南投市南崗工業區仁和路27號

電　　話：(049)2254221-3

服務專線：(049)2254615

訂購專線：0800-491666

傳　　真：(049)2254617