衛署藥製字第 025245 號

血 壓 降 下 劑

“東洲”安血平注射液 20 公絲/公撮（亥爪拉任）

Aprelazine Injection 20mg/ml (Hydralazine)

本品直接作用於中腦之血管運動中樞(Vasomotor Center)，使末梢小動脈擴張，增加腎血流量，減輕腦血管之緊張，而使血壓穩定下降，本品靜脈注射後於 15~20 分鐘出現藥效，本品不會像一般降壓劑引起起立性低血壓現象，可避免因低血壓所引起之身體傷害，如暈厥，腦部損傷，故可用於治療各類型高血壓急症，如子癇，高血壓性腦症。

【成　分】Each ml contains：

Hydralazine Hydrochloride……20 mg

(賦形劑): Propylene Glycol, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Water for Injection.

【適應症】

高血壓

【用法，用量】

成人通常每次 20 ~ 40mg，肌肉注射或緩慢靜脈注射，如有必要，可反覆使用，點滴注射時應以生理食鹽水或 Ringer 溶液稀釋使用，但不適合以 Dextrose 溶液稀釋。

【本藥限由醫師使用】

【禁忌症】

(1)對 Hydralazine 過敏之患者。

(2)冠狀動脈疾患(cornory artery disease)及風溼性僧帽瓣心疾患者(mitral valvular rheumatic heart disease)

(3)頭蓋內出血急性期之患者。

【注意事項】

(1)Hydralazine 於大劑量長期使用時，可能引起全身性紅斑狼瘡，風溼性關節炎，皮膚反應，發熱，但在不超過 200mg/day 之推薦劑量下，很少發生，如有發生，只需減量或停藥，即可消除，嚴重時則需以 steroids 適當治療。

(2)對於服用 MAO inhibitors 或 Tricyclic Antipressants 之病人或麻醉下之病人，為避免發生低血壓，應小心使用。

(3)Hydralazine 與其他注射用降壓劑如`diazoxide 一起使用時，須小心觀察血壓是否過度降低，因此二種注射劑合併時，偶而會發生血壓過低之現象。

(4)於動物試驗時，曾發生口蓋裂等異常胎仔之摧畸形報告。雖然對於人類尚未有此種催畸形之報告，但對於妊婦或可能有妊娠之婦女，應斟酌其利弊，謹慎使用。

(5)對於過去曾有冠狀動脈疾患,僧帽瓣心疾之患者及甚機能障害之患者，腦血管障害之患者，應謹慎使用。

(6)Hydralazine 雖亦可能引起姿勢性低血壓，但較神經節遮斷劑為少。

(7)於大劑量長期使用，應定期做血液檢查，因 Hydralazine 於大劑量長期使用時，可能引起血液惡病質，如血紅素減少，紅血球減少，白血球減少，顆粒球減少，如有此種現象發生，應中止投與。

【副作用】

Hydralazine 引起之副作用通常可因降低劑量而恢復正常，有一些則需停藥才能恢復正常。

(較常見之副作用) 頭痛、心悸、惡心、嘔吐、食慾減退、心跳加速。

(較少見之副作用) 鼻充血、潮紅、流淚、結合膜炎、感覺異常、眩暈、震顫、肌肉痙攣、精神抑鬱、焦慮、過敏、便秘、排尿困難、血液惡病質。

【包　裝】

0.5ml, 1ml, 2ml/Amp, 100 支以下盒裝.

委託者:**東洲化學製藥廠股份有限公司**
新北市蘆洲區中山二路 195 巷 12 號
電話:(02) 2281-5252　傳真:(02) 2281-8282
受託製造廠：杏林新生製藥股份有限公司
桃園縣龍潭鄉三和村店湖一路 237 號