W 95 mm × H 240 mm

美惠痛膜衣錠 500 毫克(每非那)
Mefeton F.C. Tablets 500mg

本藥須由醫師處方使用　　衛署藥製字第 025396 號

【成　　分】每錠中含有：

Mefenamic acid ..... 500.0 mg

賦形劑：Lactose、Sodium Starch Glycolate、Microcrystalline Cellulose 101、Sodium Lauryl Sulfate、Methylcellulose、Magnesium Stearate、Synthetic Silica、Water Purified、Hydroxypropyl Methylcellulose、Titanium Dioxide、PEG 6000、Tartrazine、Alcohol 95%、Water Purified。

【適 應 症】

手術、外傷後炎症和腫脹之緩解，下列疾患之消炎、鎮痛、解熱、變形性關節症、腰痛症、症候性神經痛、頭痛、副鼻腔炎、月經痛、分娩後之疼痛、齒痛、下列疾患之解熱、急性氣道感染症。

【用法用量】通常成人每次 500 mg，每天三次於飯後服用。

【禁　　忌】

對本藥曾產生過敏者，請勿使用。患胃潰瘍或慢性胃腸道發炎者，請勿使用。14 歲以下安全性尚未建立，避免使用。

【警　　語】

本藥最好不要連續服用一星期以上。如果有腹瀉產生時，應即停藥。對於患有肝、腎疾病之患者，應謹慎使用。服用本劑時 BUN 值會上升，懷孕及可能懷孕之婦女避免使用。

【注意事項】

1.胃腸道發炎之患者應注意使用。若有發疹現象時應即停藥。本藥可能會延長凝血時間，因此對於正在接受口服抗凝血劑治療之患者，應常常檢測凝血時間。對於氣喘之患者，本藥可能會加重其病情，故應謹慎使用。

2.對肝臟之影響：

服用 NSAID 類藥品(包括：mefenamic acid)之患者中，最高有 15%可能發生單一或多項肝功能指數略為增加之情形。繼續治療後，這些檢查值異常現象可能會惡化、保持不變，或只是短暫現象。在 NSAID 類藥品之臨床試驗中，約有 1%之患者通報 ALT 或 AST 顯著升高(約為正常值上限之 3 倍以上)。此外，曾被通報之罕見嚴重肝臟不良反應案例，包括：黃疸及致命之猛爆性肝炎、肝壞死、肝衰竭，其中一些為死亡案例。在 mefenamic acid 治療期間，若患者出現肝功能異常之病徵及/或症狀，或肝功能指數異常時，應評估是否發展成更嚴重之肝臟不良反應。若出現肝病之臨床病徵及症狀，或全身性症狀(例如：嗜伊紅性白血球增加、皮疹等)，應立即停藥。

【副 作 用】

1.嘔吐、噁心、貧血、無顆粒細胞症、血小板減少、紫斑症等血液障害、食慾不振、頭痛、血尿、排尿障害。

2.肝膽副作用：單一或多項肝功能指數略為增加、膽汁鬱滯性黃疸、輕度肝毒害、肝炎、肝腎症候群。

【儲藏條件】請儲存於緊密容器、陰涼(25°C 以下)避光處所。

【包　　裝】6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

LT-FCT003

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號