

# 綜合感冒治療劑

## 解熱佳液

### Anti-cold good Solution

衛署藥製字第025405號

本劑主成份具有鎮痛解熱之作用，再配合著支氣管平滑肌弛緩劑，抗組織胺劑鎮咳祛痰劑等藥物，使藥效加強，對於感冒諸症狀，具有顯著的緩解作用。

#### 【成分】有效成分及含量 (Each ml contains) :

Acetaminophen.....	15mg
Dextromethorphan HBr.....	0.75mg
DI-Methylephedrine Hydrochloride.....	0.45mg
Glyceryl Guaiacolate.....	4mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.12mg

其他成分(賦形劑)：Alcohol、Sucrose、Glycerin、Sodium dehydroacetate、Sorbitol solution、Cochineal red A、Strawberry essence、Sodium cyclamate、Purified Water

【用途(適應症)】感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、嗜痰、發熱、頭痛)之緩解。

#### 【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
- (一) 3歲以下。
- (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (五) 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退烧等藥品。
- (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退烧或綜合感冒等藥品。
- (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量。
- (四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- (五) 不要服用本藥超過七日。(六) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

(八) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

(九) 不得與酒精性飲料併用。

#### 【用法用量】

成人及15歲以上	一日3次，每次10ml
11歲以上未滿15歲	一日3次，每次6ml
8歲以上未滿11歲	一日3次，每次5ml
5歲以上未滿8歲	一日3次，每次3ml
3歲以上未滿4歲	一日3次，每次2ml
3歲以下	請洽醫師診治

#### 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】10~4000毫升玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166

http://www.chungmei.com.tw