"元宙"美力特 錠 2.5 公絲(每索特)

Methopterin Tablets 2.5 mg (Methotrexate)

衛署藥製字第 025520 號

【成　　分】

Each Tablet contains：

Methotrexate …… 2.5 mg

【賦 形 劑】

Starch、Lactose、Magnesium Stearate。

【作　　用】

本品有類似葉酸的構造，對葉酸轉化成 Tetrahydrofolic acid 有甚強且持續的阻礙作用，以阻止核酸與 purin 的生合成，呈現抗腫瘍作用，本品又能抑制抗體的產生，本品對 Dihydrofolic acid 還原酵素有異常強烈的親和性，幾達非可逆性的程度。

【適 應 症】

白血病、絨毛性腫瘍(絨毛上皮腫、破壞奇胎、胞狀奇胎)之緩解。

【用法用量】

1. 白血病：按患者的耐藥量及症狀的程度而定，一天幼兒 1.25 mg ~ 2.5 mg，小兒 2.5 ~ 5 mg，成人 5 ~ 10 mg，一星期中使用 3 ~ 6 天。
2. 絨毛性腫瘍：5 天為一療程，一天為 10 ~ 30 mg 休藥期間 7 ~ 12 天。

本藥須由醫師處方使用。

【注　　意】

1. 投與中，應常做白血球數、血小板數檢查，尤其是白血球檢查於治療最初一個月為每天，其後一週 3 次，若白血球數降至 3000 以下，為預防感染，應投與適當的抗生素(如 Minocycline. Tetracycline 類等)，如有必要則再做骨穿刺檢查，測定出血時間及血液凝固時間。
2. 禁忌：肝、腎、骨髓機能不全之患者。
3. 慎重投與：有感染症者。
4. 有催畸型作用，孕婦不得使用。
5. 過量投與或發現副作用時之處置法：通常用量而有副作用發生時，用 Leucovorin 成人一次 6-12 mg，每隔 6 小時 1 次，共 4 次，過量投與時，按本品超過之量投與等量的 Leucovorin。

【副 作 用】

口腔粘膜潰瘍、下痢、出血、急速之白血球減少症、進行性貧血、血小板減少症、脫毛、色素沉著、紅斑症、中毒性狀有皮膚症狀、口內炎、腸炎、消化器障礙、月經異常、暫時性乏精液症、白血球血小板減少、肝障礙。

【包　裝】

50、100、500 、1000 粒/瓶裝。

元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO.,LTD
南投縣南投市南崗工業區南崗三路 272 號
TEL：(049) 2253190