衛署藥製字第025555號

陽生 Y S 藥品

"陽生"撲菌使錠

Baktsin Tablets"Y.S."

Trimethoprim與Sulfamethoxazole兩種藥物單獨使用時可呈制菌作用，但合併使用時即可產生殺菌作用，且對此兩種藥物單獨使用時所生抗藥性之微生物也能產生抑制作用，故本品是採用這兩種藥物製造而成。

「本品之特點」:

1.確實具有殺菌作用。
2.抗菌範圍廣，效果顯著，對抗生素具有抗藥性之葡萄球菌亦具優良效果。
3.服用簡便，早晚各一次即可。
4.與抗生素不產生交叉耐性。
5.副作用少。

本品具有上述之優點，使用本品即可解決了抗生素濫用而產生抗藥性菌之問題，本品可安心之使用。

【成分】每錠含有：

Sulfamethoxazole.....400mg
Trimethoprim.....80mg
賦形劑：Lactose、Starch、Explotab、P.V.P K30、Magnesium Stearate

【適應症】由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道、尿道感染症。

【用法用量】成人(含12歲以上)

一般劑量：每日2次，每次兩錠，早晚服用。
最低劑量或需長期治療(連用14天以上)：每次一錠
最大劑量或重症時：每次三錠
2~ 5歲：每日2次，每次1/4~1/2錠，早晚服用。
6~12歲：每日2次，每次1/2~1錠，早晚服用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】:

一.極大量使用，可能引起血液像之變化，但當停藥後即恢復正常。
二.對腎臟機能異常的病人，減量投與或將投藥間隔時間拉長。
三.預防
1.有腎、肝功能障礙患者應謹慎使用，治療期間應作腎功能檢查。
2.應保持適當的流體預防產生結晶尿雨結石。
3.本品與抗凝血劑(warfarin)併用抑制彼此間作用。
(1)副作用：偶有再生不良性貧血、白血球減少、顆粒球減少、血小板減少、溶血性貧血等(初發症狀：發熱、咽頭痛、口內潰瘍、皮膚粘膜、結膜蒼白、紫斑等)
(2)過敏：偶有休克症狀(初發症狀：不適感、口內異常感、眩昏耳鳴、發汗等)間有發疹、光線過敏症。
(3)皮膚：偶有Steven-Johnson症候群、LE症候群、紅疹、發疳、脫落性皮膚炎。
(4)偶有肝腎障礙。
(5)神經系：頭痛、發熱、末梢神經炎、眩昏。
(6)胃腸道：嘔心、嘔吐、肝炎、腹瀉、腹部疼痛。

【禁忌】

1.顯著肝實質損害，血性惡病質(Blood dyscrasias)或重症腎機能不全之患者。
2.對磺胺藥物(Sulfonamides)有過敏之患者。
3. 妊娠期間。
4.未滿一星期之早產兒、新生兒。

【包裝】50 100 500 1000粒瓶裝

Y S 台灣陽生製藥工業股份有限公司
屏東市龍華路381號