

# “大安” 欣克克得注射液 10 公絲/公撮

## SINICORT Injection 10mg/ml (Triamcinolone Acetonide Aqueous Suspension)

衛署藥製字第 25563 號

### 【劑型、含量】注射液，每 1mL 含：

Triamcinolone acetonide.....10mg  
賦形劑：Sodium chloride、Sodium carboxymethylcellulose、Polysorbate 80、Methylparaben、Propylparaben、Tetrahydrofurfuryl polyethyleneglycol ether、Water for injection

### 【特點】

- 藥效長而持久：  
較 Hydrocortisone 強 40 倍，較 Prednisolone 強 10 倍，藥效持續二星期以上。
- 副作用較其他種 Steroid 少：  
肌肉注射時於一般劑量下，不產生水腫，高血壓及鉀過份排泄之副作用，關節注射時不產生全身副作用。
- 注射時無痛：  
對組織無刺激性，注射時無痛即適於肌肉注射，以達到全身療效，亦可作關節腔內或其他之局部注射，以達到局部療效，並可二者併用，而達更佳之治療效果。
- 本品特別適用於頑固性、慢性、長期之疾患及其他 Steroid 治療無效之疾患。

### 【適應症】

風濕性關節炎、膠原病、過敏性疾病、過敏性氣喘、重症皮膚疾患、過敏性及發炎性眼科疾患，結合組織炎及關節炎樣疾患。

### 【用法用量】

- 本藥限由醫師使用。
- 應用本品時先充分振盪，使成均一懸濁液，然後以 1/2 之注射針抽取適當量注射之，通常成人每次 40~80mg 深部肌肉注射，成人初劑量以 60mg 為最適宜，6~12 歲初劑量為 40mg，以後視症狀適宜增減之，亦可作局部注射用，唯局部應用時須依下表之劑量投與。

注射部位	每次注射之劑量
膝、肩等大關節	0.5~1.5mL(5~15mg)
小關節、滑液囊內、韌鞘內、炎症周圍。	0.25~1.0mL(2.5~10mg)
軟組織內	0.1~0.5mL(1~5mg)
皮內	本劑之五倍稀釋液 0.1~0.2mL(0.2~0.4mg)

### 【副作用】

- 本劑較其他 Steroid 製劑之副作用少，在一般劑量下，不產生鈉之滯留，因此不產生水腫，高血壓及鉀之過份排泄等副作用。
- 本劑之關節等局部注射時，不產生全身性副作用。
- 在大量長期使用時可能引起輕微之肌肉萎縮。

### 【警語及注意事項】

- 本劑禁用於靜脈注射。
- 急慢性感染症，應用本劑時，請併用適當之化學療法藥劑或抗生素藥品。
- 本劑注射時，注射器反操作，必須保持絕對無菌。
- 本劑治療期間，請充分補充蛋白質。
- 六歲以下之孩童，盡量避免使用本劑。
- 本劑肌肉注射時，應用於糖尿病患者須增加 Insulin 之藥量。
- 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
- 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

### 【禁忌】

- 肌肉注射時，禁用於胃腸潰瘍、精神病、糖尿病、結核病、心臟血管障礙、懷孕之婦女(尤其是妊娠首三個月)之患者，及其他真菌和病毒引起之疾病。
- 局部注射時，請勿應用於淋菌性及結核性關節炎。

【包裝】5 公撮 10 小瓶裝、10 公撮 10、50 小瓶裝、2 公撮 10 小瓶裝。

委託者：**大安化學製藥股份有限公司**

公司：台南市勝利路 473 號 TEL：(06)2328797

製造廠：大豐製藥股份有限公司

彰化市延平里岸頭港 11 號