


**Cephalosporin 系抗生素**  
“信東”**賜福得修膠囊** 500 毫克  
(西華卓西)  
**Cefadroxil CAPSULES 500mg "S.T."**

Cefadroxil monohydrate 是頭孢子菌素 (Cephalosporin) 衍生而來之半合成新型口服抗生素，為白色—微黃色結晶性粉末，易溶於水，於酸中穩定。其結構如下：



化學名：7-{[D-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}-3-methyl-8-oxo-5, -thia-1-azabicyclo [4.2.0] oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate.

**【成 分】**

主成分：Each Capsule Contains :

Cefadroxil monohydrate equivalent to cefadroxil anhydrous base ..... 500mg (Potency)

賦形劑：Adsolider-101、Magnesium Stearate、Capsule Shell (含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。

**【特 點】**

1. 本劑係廣效性抗生素，其作用機序係抑制細菌細胞壁之合成。
2. 本劑口服不受食物干擾，口服吸收快，且持續時間久，短時間內即可達血中有效濃度，且可持續 12 小時之久，口服後約 24 小時內有 90% 以上以原有形態從尿中排出體外。

**【作 用】**

本劑對葡萄球菌， $\beta$  型溶血性鏈球菌、肺炎雙球菌、變形桿菌、大腸桿菌、克雷白氏桿菌及其它具有感受性細菌引起之感染症有效，一般用於治療下列之感染症：

1. 尿道系統感染症：由於大腸桿菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌引起的各種感染症。
2. 皮膚、皮膚組織感染症：由於葡萄球菌、鏈球菌引起的各種感染症。
3. 呼吸器感染症：如  $\beta$ -溶血性鏈球菌引起的咽喉炎。

**【適 應 症】**

革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之感染症。

**【用法・用量】**

本藥須由醫師處方使用。

對成人而言：

1. 尿道系統感染症：
  - ① 沒有併發症之下部尿道系統感染，通常劑量一天為 1g 或 2g，分一次或二次服用之。
  - ② 其他各種尿道感染症，通常劑量 1 天為 2g，分二次服用之。
2. 皮膚或皮膚組織感染症：通常劑量一天為 1g，分一次或二次服用之。

3. 呼吸器感染症：由於 $\beta$ 型溶血性鏈球菌引起之咽喉炎，通常劑量一天為1g，分二次服用10天。

**對腎臟功能不全之患者：**

必須依其 Creatinine 之廓清率 (Clearance) 來調整劑量及投與間隔時間，以防止其藥物積蓄，通常劑量最初為1g，而持續劑量為500mg 其間隔時間如下：

Creatinine Clearances	間 隔 時 間
0~10mL / min	36 小時
10~25mL / min	24 小時
25~50mL / min	12 小時
750mL / min	按正常規定

**[注 意 事 項]**

1. 曾對 Cephalosporin 系製劑有過敏反應之患者，不可使用本劑。
2. 有下列情況之患者，宜慎重投與：
  - 對 Penicillin 製劑有過敏反應之患者，因臨床及實驗室均有 Penicillin 與 Cephalosporin 部分交互過敏之報告。
  - 曾有某些型式之過敏反應者，尤其是對藥物有過敏現象者，應小心使用。
  - 高度腎臟機能不全之患者。
3. 長期使用本劑，可能引起非感受性微生物過度繁殖，造成重複感染，須注意之。
4. 服用本劑，可能有假性 Coomb's test 反應發生。
5. 對老鼠試驗，並沒有造成畸形或抗受孕之報告，但對懷孕婦女之安全性，臨床上尚未有明確報告。

**[副 作 用]**

1. 服用本劑，臨床上有噁心、下痢、排尿困難等胃腸症狀出現，可與食物同時服用，減低噁心之副作用。
2. 服用本劑，倘有發疹、蕁麻疹、淋巴腺腫脹、性器搔癢症、腫炎等過敏症狀出現時，應立即中止使用，並以一般之藥劑治療之（如 Pressor amine、Corticosteroid，or Antihistamine）。

**[不 良 反 應]**

嚴重的皮膚不良反應，如多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson syndrome) / 毒性表皮性壞死溶解症 (toxic epidermal necrolysis)。

**[包 裝]**

4~1000 粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

**[保 存 條 件]**

室溫25°C以下避光貯存。

須置於小孩接觸不到之處。

衛署藥製字第 025659 號



信東生技股份有限公司 觀音廠

桃園市觀音區樹林里國建一路1號

54031219 ④