90x20.2cm/104.10.08

〝大豐〞 ●抗菌性化學治療劑●

必治滅菌膠囊

250 毫克（匹培咪迪）

PIPEMIDON

CAPSULE 250mg T.F.(PIPEMIDIC ACID)

本劑對於綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌等革蘭氏陰性桿菌有強力抗菌作用，它們的作用機序為阻礙細菌 DNA 的合成，故亦有殺菌作用。對於其他抗生物質耐性菌亦有抗菌作用，使用 piromidic Acid 或 Nalidixic acid 無效之耐性菌亦有效。
本劑口服吸收良好，組織移行性佳，體內幾不被代謝，而保留活性型，主要由尿中排泄，故於泌尿系統疾患、前列腺炎、中耳炎效果極佳。

【主要成分】：每粒膠囊中含有：
Pipemidic acid trihydrate.....295mg
(eq to pipemidic acid.....250mg)

【賦形劑】：Corn Starch Dried, Magnesium Stearate。

【膠囊成分】：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Brilliant Blue FCF, New Coccin, Sunset Yellow FCF, Indigo Carmine, Titanium Dioxide。

【適應症】：腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎。

【用法用量】：尿路感染，前列腺炎，通常成人一次 1～2 粒，一日 3～4 次。中耳炎時一次 2 粒，一日 3～4 次，可依年齡、症狀酌予增減，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

①會對本劑有過敏性的患者，禁用。
②慎重投與：高度的腎障害患者，宜謹慎給藥。
③副作用：
ⓐ過敏症：偶爾有休克症狀，顏面浮腫，或發疹蕁麻疹、搔癢感、發熱等過敏症狀，若有此症狀，應中止給藥。
ⓑ腎臟：有時 BUN，血中 Creatinine 上昇，類似化合物 (Piromidic Acid) 投與時，曾有腎障礙發現或擬似這種症例的報告發現。
ⓒ肝臟：有時 S-GOT，S-GPT 值上昇，或 ALP 值上昇。
ⓓ胃腸：有時食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不快感，膨滿感，胃痛、胸部發熱、下痢、便秘等症狀。
ⓔ血液：爾偶白血球減少，若有血小板減少之發現時，小心觀察，若認定有異常時，即中止給藥。
ⓕ其他：有時目眩、頭痛、頭重，全身倦怠感、口渴口內炎的發生。若慢性腎不全時，由於血中和髓液內濃度的偏高，引起癲癇的發作例子亦有之。
④妊婦、授乳婦的投與：妊娠中或授乳中的投與安全性尚未完全確定前，妊婦或可能懷孕的婦女或授乳中的婦女，避免服用。
⑤小兒的投與：對小兒投與安全性尚未完全確定前避免使用。
⑥臨床檢查值的影響：尿中蛋白質測定時，若以煮沸法或試驗紙法測定，呈現偏高之值。
⑦其他：動物實驗（小狗）曾有關節異常的報告。

包裝：6～1000粒瓶、盒裝。
衛署藥製字第 025698 號

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司
公司．工廠：彰化市延平里岸頭巷11號