〝大豐〞 ● 偏頭痛治療劑 ●

治偏頭痛膜衣錠®

ANTIMIGRAINE F.C.TABLETS T.F.

本藥主要成分為 Ergotamine tartrate,Caffeine ，其中 Ergotamine tartrate 為一種alpha adrenergic blocking agent 具有對於末梢血管、腦血管平滑肌的直接刺激作用，一般而言，偏頭痛發作時，頭蓋血管的擴張，與緊張的喪失，若呈現血管緊張作用時，頭痛則消失，Caffeine能促進Ergotamine tartrate的腸管吸收，同時增強Ergotamine tartrate對頭痛緩解作用。服用此劑最佳時機為當偏頭痛發作的前驅症狀發現時，可達最佳效果。酒石酸Ergotamine的一般藥理，主要為末梢血管收縮作用，由此伴隨血壓的上昇，而 Caffeine 的藥理作用為中樞作用，呈精神賦活作用，心機能促進、利尿等作用，但在本藥中，此些作用並不顯著。本藥的吸收、代謝、分佈、排泄，經口投與 30 分鐘後，血中濃度中即可測出，但3小時達最高，持續約8小時，大部分由糞便中排泄掉。

●主要成分：每錠中含有：

Ergotamine tartrate.....1mg

Caffeine anhydrous.....100mg

●賦 形 劑：

Arbocel, Di-TAB, Primojel, Aerosil, Magnesium Stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethylene Glycol 6000, Titanium Dioxide, Talc, Tartrazine (Al-lake)。

●適 應 症：血管性頭痛如偏頭痛、組織胺性頭痛。

●用法用量：通常成人一次1～2錠，一天最大服用量為6錠，普通服法1～2錠，口服後30分鐘觀察效果，若完全沒有改善時，可追加1錠，必要時1天量1～6錠範圍內，適宜追加之，小孩減半或依年齡適宜減量，本藥須由醫師處方使用。

●注意事項：

(1)禁忌：ⓐ末梢血管障害，閉塞性血管障害，狹心症、冠動脈硬化症、嚴重高血壓症患者。ⓑ肝或腎機能障害患者。ⓒ敗血症患者。ⓓ緑内障患者。ⓔ妊婦或有懷孕可能的婦人。ⓕ授乳婦。ⓖ曾對本藥或麥角生物鹼製劑有過敏症者

(2)慎重投與：心臟障害患者。

(3)副作用：ⓐ過敏症：局部性浮腫，搔癢感，或發疹，若遇此情形時，中止投與。ⓑ循環器：心悸高進，徐脈、青色症（チアノーゼ），胸部不快感。ⓒ精神神經系：不眠、不安、振戰、暈眩。ⓓ運動器：知覺異常（四肢痲痺）、四肢筋痛、四肢脫力感。若有四肢末端刺痛感時，中止給藥。ⓔ消化器：噁心、嘔吐、下痢。ⓕ長期投與：高度的血管收縮、動脈内膜炎、仔細觀察之，慎重投與。若長期投與後，急速中止，可能引起禁斷症狀如頭痛。ⓖ其他：瞳孔縮小或擴大。

(4)妊婦、授乳婦的投與：ⓐ Ergotamine tartrate 為具有子宮收縮作用，故妊婦或可能懷孕的婦人避免使用。ⓑ Ergotamine tartrate 母乳中移行之故，授乳婦避免使用。

(5)相互作用：併用 propranolol 或 triacetyloleandomycin 時末梢血管收縮作用會增強，若併用時，須慎重投與。

(6)適用上注意：通常成人1日量最大服用量為6錠，1週内最大服用量為10錠。

●包裝：6～1000錠瓶、鋁箔盒裝

衛署藥製字第025841號

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司

公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

檔號：104.731誠-10T