

仿單 W 9.5 cm x H 17.5 cm

定克敏 錠 4 毫克(塞浦希)

Decamin Tablets 4mg (Cyproheptadine)

本藥須由醫師處方使用 衛署藥製字第 025941 號

【成分】每錠中含有：
Cyproheptadine Hydrochloride 4.0 mg
賦形劑：
Corn Starch、Lactose、Brilliant Blue FCF、Talc、
Povidone K-30、Magnesium Stearate

【適應症】過敏性皮膚炎、神經性皮膚炎、濕疹、枯草熱、季節性鼻炎、接觸性皮膚炎、蕁麻疹、血清病、支氣管氣喘、過敏性氣喘。

【用法用量】通常成人每次一錠，每天 3 ~ 4 次使用。

【注意事項】本劑投與中之患者，應避免從事開車等危險性之機械操作。

【禁忌】腺內障、狹窄性胃潰瘍、幽門十二指腸閉塞、前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患、支氣管氣喘之急性發作時、新生兒、赤熱兒、老年之衰弱患者、對本劑曾產生過敏之患者。

【慎重投與】支氣管氣喘、眼內壓亢進、甲狀腺機能亢進症、心血管障害、高血壓。

【副作用】1.過敏症：有發疹等過敏症狀出現時應中止使用。
2.精神神經系：嗜眠、倦怠感、少有頭痛、頭暈、焦燥感、興奮、錯亂等症狀出現。
3.消化器：口渴、噁心、下痢、腹痛。
4.血液：少有紫斑、血小板減少、白血球減少等血液障害出現，若有此種現象出現應即中止使用。
5.其他：頻尿，少有粘膜乾燥、浮腫等現象。
6.妊婦、授乳婦之投與：有關妊娠婦之投與其安全性尚未建立，投與時應權衡其利弊。授乳婦請勿投與。

【相互作用】當和 CNS depressant、MAO inhibitor、Anticholinergic 等藥劑併用時，相互作用增強，此時應減量，慎重投與。

【包裝】6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

【儲藏條件】請於室溫(25℃)保存，且於有效期限內使用。

LT-T112

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號