衛署藥製字第 26090 號

“新喜”愛克炎錠 250 毫克（那普洛先）

Naproxen Tablets 250mg“N.C.P.”

本藥須由醫師處方使用

【成　分】每錠中含有：

有效成分及含量：Naproxen …… 250mg

賦形劑： Pregelatinized Starch、 Lactose、Corn Starch、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate

【作用】

以小白鼠做醋酸法，壓刺激法及兔子做 Randall Sdlitto 法等實驗證明 Naproxen 具有強力鎮痛作用。解熱作用及對關節炎、浮腫、肉芽腫等具有抗炎症作用，對胃刺激比 Aspirin 及 indomethacin 弱，經口投與後，很快由胃腸道吸收，在 2~4 小時血中濃度達高峰，本劑半衰期約達 14 小時(8~16 小時)，在 24 小時內約有 50%由尿中排泄，5 天約 94% ，代謝物大部份是 glucuronide。

【用途(適應症)】

慢性風濕性關節炎，變形性關節症，腰痛、急性上呼吸道炎等之消炎、鎮痛、解熱。

【注意事項】

一般注意事項：慢性患者長期投與本劑要定期做尿、血液及肝機能檢查有異常情形時宜減量或停藥。急性患者投與本劑要考慮急性炎症，痛及發熱程度，原則上同一藥劑避免長期使用。服用期間要留意副作用之發生，如有感染症時宜併用抗菌劑，小心觀察慎重投與。避免與其他消炎鎮痛劑併用。

對高齡及小兒的副作要特別注意，必要時服用以最少量慎重投與。

禁忌：消化性潰瘍，重症血液異常，肝障害、腎障害、心機能不全之患者，Aspirin 及本劑過敏症患者禁止使用。

慎重投與：曾患有消化性潰瘍，過敏症及支氣管氣喘之患者，宜謹慎投與。

副作用：有過敏症如發疹、搔癢，消化性潰瘍出血，血液檢查異常，肝腎機能異常時宜中止使用。

妊婦、授乳婦：動物實驗報告本劑會使分娩遲延，故妊娠末期不宜使用，妊娠中及授乳婦投與之安全性尚未確立，故宜慎重使用。

一歲以下乳兒不用。

【用法用量】

一次 250mg，一天二次，飯後服用，**本劑須由醫師處方使用**。

【包裝】

4-1000 錠瓶裝。

【儲存條件】

室溫(15~25℃)儲存。

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號