衛署藥製字第 26269 號

Ketopen Ketopen Ketopen

〝皇佳〞 剋痛平 注射液 20 公絲/公撮（尼夫平）

Ketopen Injection 20mg/ml (Nefopam)

剋痛平(Ketopen)注射液為一最新強力和速效之鎮痛劑，不具有麻醉性鎮痛劑之成癮性和中樞呼吸抑制副作用，但卻具有麻醉性鎮痛劑之鎮痛效果，可解除一般急性和慢性之中度及嚴重疼痛症，是止痛領域之一大鉅獻。

〔主 成 份〕：每一安瓿(1ml)中含有：

Nefopam Hydrochloride……..20mg

〔賦 形 劑〕：Benzyl Alcohol、Water for injection。

〔作用特點〕：1.本品作用點在脊髓〈spinal cord level〉，能抑制疼痛感覺之傳導，但其真正機轉目前尚未十分明顯。

2.本品除了鎮痛作用外，尚具有肌肉弛緩之作用(muscle relaxant)。

3.本品作用非常迅速，注射後 15 分即可發揮效果，於 1 至 1.5 小時內達到最高峯，持續作用時間 4 個小時。

4.本品沒有成癮性，沒有呼吸抑制(包括充血性心臟衰竭和氣管、肺性疾病之患者)。

〔適 應 症〕：鎮痛

〔用法用量〕：1.通常成人每次 1 安瓿肌注或靜注(平躺著注射) ，必要時可每六小時使用一次，12 歲以下之兒童不推薦使用。

2.肌注時，注射器需先抽引以確定針頭沒有打在血管上後，再行給藥。

3.靜注時，需緩慢注射，一安瓿約四分鐘(使用 26 gauge needle)。

4.當注射完後仍需保持平躺約 15~20 分鐘,再緩緩起立。

本藥限由醫師使用。

〔注意事項〕：

1.禁忌症：1)對曾患有暈厥症病歷之患者。

2)不能使用於心肌梗塞之患者。

2.警　告：1)妊娠期：雖在動物試驗尚未發現畸形胎，但本劑如他藥一樣，於妊娠前三個月內使用時宜謹慎；人類哺乳期使用本劑之資料尚缺乏，故使用時宜小心衡量其優點以及對母子所可能造成之損害。

2)兒童：十二歲以下兒童之安全性及療效，尚未確立。

3.注　意：1)如使用於患有青光眼、尿滯留或肌功能及腎功能障礙的患者，須慎重投與。

2)對正使用 MONOAMINE OXIDASE 抑制劑的患者，不宜使用。

4.副作用：1)一般常見之副作用為噁心、頭暈倦睡口乾，次為盜汗、神經過敏、失眠、嘔吐。

2)使用注射劑型時，注射部位會有疼痛感。

5.過　量：目前尚無使用過量之報告，故並無特殊解法，倘有過量發生時，宜採用支持療法，包括洗胃、使吐、利尿。

〔包 裝〕：10 安瓿、100 安瓿盒裝。

委託者：皇佳化學製藥股份有限公司
ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.
高 雄 市 鳥 松 區 松 埔 路 一 巷 1 號
電話：(07)7310537　　傳真：(07)7310538

製造廠：政德製藥股份有限公司
雲 林 縣 大 埤 鄉 豐 田 路 2 號