綜合電解質營養劑

信東 1 號 點滴注射液

TBC No.1 INJECTION "S.T."

本公司的 TPN 1 號，2 號，3 號，4 號綜合電解質營養劑，對於小兒急性腸胃炎所引起之電解質、水分大量流失，嚴重者導致酸中毒、鉀流失、低鈉血症，可給予安全而適宜之水分電解質補充。亦可應用於最近發展之中心靜脈營養療法（Total Parenteral Nutrition），當做基礎液使用。

〔組成〕

主成分：Each ml contains

Dextrose……38mg

Sodium Chloride…… 0.97mg

Sodium acetate……0.66mg

Magnesium chloride • $6H_2O$……0.30mg

Potassium acetate…… 1.18mg

賦形劑：Patassium phosphate monobasic、Sodium Bisulfite、Malic acid、Water for Injection。

電解質濃度：

成分 / 單位	Na^+	K^+	Mg^{++}	Cl^-	$Acetate^-$	Phosphate	Dextrose（g/L）	pH	Osmotic P.Ratio
mEq/L	27.5	18	3	19.5	20	18	38	4.0-6.0	1

＊Osmotic P.Ratio：與 0.9%生理食鹽水比

〔適應症〕

小兒之水分，電解質營養補給，尤其是新生兒維持液。

〔用法 • 用量〕

通常一回 500ml，靜脈點滴輸注，依年齡、症狀適宜增減之。

本藥限由醫師使用。

〔注意事項〕

一、注射速度應緩慢，初期 1 小時內輸注 10-20ml/kg，然後在 23 小時內點滴完畢。

二、1.取用時：

(1)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。

(2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

2.輸液套選用及插入法：

(1)請依輸液套使用方法正確使用。

(2)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割（coring）產生碎片。

(3)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔包裝〕

玻璃瓶：100ml, 250ml, 500ml, 1000ml

塑膠瓶：500ml

衛署藥製字第 026420 號

信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號