

"生達"必樂信 膠囊 20公絲 (匹洛卡)

Piroxim Capsule 20mg "Standard" (Piroxicam)

"生達"必樂信膠囊20公絲，係本公司精心研究開發之新型非類固醇抗炎劑，其主成分Piroxicam的化學名稱是1,2-benzothiazine-1,1-dioxide的氮一混環羰醯胺。經臨床實驗證實此藥對於由外傷、外科手術、生產手術等不同原因引起的水腫、發炎、發熱、組織增殖、疼痛等現象極有效果，而且作用時間快效，藥效持續時間長，同時本藥和阿司匹林併用時，並不影響各藥在血液中的治療濃度，這一特點為其他非類固醇抗炎劑所無可比擬，故本品對於類風濕性關節炎，骨關節炎(關節痛，退化性關節炎)，僵直性脊椎炎，急性肌肉骨骼損傷和急性痛風的改善與治療，效果極為優異。

「主成分」：每粒含：

Piroxicam20mg

「作用特點」：

- 1.本品具有獨特之分子式，是一種Oxicam之結構，吸收迅速可迅速擴散至發炎部位。
- 2.對於慢性和急性的風濕症具有高度的療效。
- 3.胃腸障礙之副作用遠較其他抗炎劑為小且具有良好的耐藥性及較長之半衰期，非常適於長期的治療。
- 4.方便於患者服用，一天一次的劑量就能得到24小時發炎與疼痛之緩解，解除晚間的疼痛感和早晨的僵直感。

「適應症」：

僵直性脊椎炎，骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)，類風濕性關節炎，急性肌肉骨骼損傷和急性痛風。

「用法用量」：

- 1.類風濕性關節炎，骨關節炎，僵直性脊椎炎：
初劑量每天一次，每次1粒，大多數病人之維持量也是每天1粒，有些病人的維持量是每天30mg，一次或分次服用，少數病人的維持量可減少到每天10mg，長期服用每天30mg以上之劑量，可能會增高胃腸副作用的發生率。
- 2.急性肌肉骨骼損傷：
最初兩天每天2粒，一次或分次服用，然後每天服用1粒，全部治療期為1~2星期。
- 3.急性痛風：
最初每天1次服用2粒，然後在4~6天內，每天2粒，一次或分次服用。治療痛風，不適合長期服用。
本藥須由醫師處方使用。

「禁忌症」：

曾對此藥過敏之患者，不能再使用。

「警告」：

對孕婦：雖然動物實驗並未顯示此藥有催畸作用，但孕婦及授乳婦人使用此藥是否安全，尚未確定。本藥作用於前列腺素合成酶(Prostaglandin Biosynthetase)，會抑制前列腺素之合成及分泌。其他非類固醇抗炎劑亦具此種作用，已知此作用與服用此類藥品的懷孕動物之難產及延遲分娩有關。

兒童：兒童在何種情況下可服用此藥及其劑量如何等問題均尚未確定。

「注意」：

服用此藥可能會引起消化性潰瘍或胃腸出血，故有胃腸病之患者，服用此藥時須特別注意。

少數病人於服用非類固醇抗炎劑(包括本藥)期間，會有血中尿素氮增加之現象。惟此種增加之現象，會止於一定之限度，且停藥後便會恢復正常，又血中尿素氮之增加與血清肌酸量之增加無關。

「不良反應」：

常見之副作用除胃腸方面以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫，一般常規檢眼鏡檢查及隙燈檢查，皆未發現病人之眼睛有任何變化，又有些人會發生與胃腸出血無關之血紅素或血球容積減少。亦有人曾經發生肝機能之變化。大多數非類固醇抗炎劑包括本藥，皆會使部分病人之血清轉胺基酶量(SGPT)增加。

「過量」：

服用過量時，可對病人採取支持及對症療法。

「賦形劑」：

Sodium Lauryl Sulfate、Lactose Dried、Magnesium Stearate、Gelatin、Purified Water、New Coccin、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF

「包裝」：

6粒樣品裝，100粒，200粒盒裝。

60粒，100粒，500粒，1000粒瓶裝。

衛署藥製字第026461號 Code NO.CP-03 電腦代號:2215100

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司二廠

台南市新營區開元路154號

藥廠、受委託盒裝分包裝藥廠

PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

台南市新營區土庫里土庫6之20號