舒 痛 糖 漿

Depain Syrup

衛署藥製字第 026482 號

本糖漿劑係採用解熱鎮痛藥，配合止咳及支氣管擴張藥而組成之綜合感冒製劑。

成　　分：

Each ml contains：

Acetaminophen……24.0mg

Glyceryl Guaiacolate……10.0mg

Phenylephrine HCl……..……...0.5mg

Dextromethorphan HBr……..1.5mg

賦形劑：Citric Acid、Ethanol、Sodium Dehydroacetate、Sunset Yellow FCF、Orange essence、Sodium Citrate Strawberry Essence、Propylene Glycol、60% Syrup

作　　用：一、Acetaminophen：爲一種解熱鎮痛劑，直接作用於中樞神經之體溫調節中樞，達其解熱鎮痛效果。
二、Glyceryl Guaiacolate：爲一合成之祛痰劑，並能促進氣管分泌物之排除。
三、Phenylephrine HCl：能緩解鼻腔及咽喉粘膜面之充血症狀。
四、Dextromethorphan HBr：本品屬於鎮咳劑。

適 應 症：緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、鼻塞、咳嗽、喀痰)。

用法用量：一日 4 次。成人每次 5ml。
12 歲以上，適用成人劑量；9 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2，6 歲以上未滿 9 歲，適用成人劑量之 1/3，未滿 6 歲之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品

注意事項：

一、 爲防止兒童誤食請妥善保管。
二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
(1) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(2) 服用本藥時不得併服其他藥品。
四、 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
五、 液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
六、 不得併服含酒精飲料。

警　　語：

一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(1) 6 歲以下不建議自行使用。
(2)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
三、患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
四、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
五、若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
六、吸菸、慢性阻塞性肺疾**(患)**，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
七、不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
八、不要服用本藥超過七日。
九、服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
十、服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
十一、本藥含 Acetaminophen 之本類製劑:
1. 肝毒性：
(1) 使用 Acetaminophen (Paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000 毫克的 Acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 Acetaminophen 成分之藥品。
(2) 病人應注意藥品的標示中是否含有 Acetaminophen 或 Paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有Acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
2. 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因爲Acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用Acetaminophen而增加肝毒性危險。

3. 過量：
(1) 服用過量 Acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
(2) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
(3) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應爲致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

4. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 Acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。

5. 嚴重皮膚反應：使用 Acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis,AGEP）、史蒂文生氏-強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome,SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis,TEN）。出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

十二、本藥含 Phenylephrine Hydrochloride，應注意下列事項：
(1)除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
(2) 服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

十三、本藥含 Dextromethorphan 之本類製劑：
服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑 (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI))者，不得使用含 Dextromethorphan 之本藥。

包　　裝：5-4,000 毫升塑膠瓶裝。
儲藏條件：請保存於 25℃以下，兒童接觸不到之處。

PIC/S GMP

製造廠名稱：人人化學製藥股份有限公司中壢廠
製造廠地址：桃 園 市 中 壢 區 南 園 二 路 3 號

藥商名稱：人人化學製藥股份有限公司
藥商地址：桃園市中壢區南園二路 3 號