衛署藥製字第 026736 號

“新喜”佑克炎錠

Unicol Tablets “N.C.P.”

本藥須由醫師處方使用

本劑是一種對綠膿菌、大腸菌、Protens、革蘭氏陰性桿菌有很強的抗菌作用的藥劑，作用於細菌 DNA 合成的阻害殺菌，口服後特別於肝臟、消化管、腎臟、膀胱等高濃度的移形，故本劑適用於腎臟、膀胱及消化管道的疾病具有特效。

【成分】每錠中含有：

主成分：Pipemidic acid trihydrate..... 294.8mg

(equivalent to pipemidic acid)..... 250mg

賦形劑：Lactose、Starch、Magnesium stearate、Carboxylmethylcellulose

【用途(適應症)】

由綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌、腸內桿菌、枸櫞桿菌、赤痢菌、腸炎弧菌所引起的腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、細菌性赤痢、腸炎、中耳炎、副鼻腔炎。

【注意事項】

(1) 禁忌：本劑對有過敏既往患者禁用。

(2) 慎重投與：高度嚴重性腎臟障害者慎重投與。

(3) 副作用：

(a) 過敏症：休克症狀、顏面浮腫、發疹、搔癢感發熱等罕有症狀，有此現象立即中止再使用。

(b) 腎臟：BUN 血中 Creatinine 值上昇可使腎臟疾病診斷錯誤。

(c) 肝臟：S-GOT,S-GPT 值上昇，ALP 上昇。

(d) 胃腸：食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不快感、膨滿感、胃痛、胸壓感、下痢、便秘。

(e) 血液：如有白血球、血小板減少時應中止再投與。

(f) 其他：有時有頭痛、頭重、全身倦怠感、口渴、口內炎出現。

(4) 妊婦及授乳婦女：安全性尚未建立勿使用。

(5) 小兒投與：安全性尚未建立勿使用。

(6) 臨床檢查值的影響：尿中蛋白質可上升可用煮沸或試紙試驗法測定。

【用法用量】

腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎	1 日 2~8 錠(500~2000mg)分 3~4 次口服之。
細菌性赤痢、腸炎、中耳炎、副鼻腔炎	1 日 6~8 錠(1500~2000mg)分 3~4 次口服之。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝。

【儲存條件】：

室溫(15~25℃)儲存。

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號