

“新喜”
保力胃錠

Polywe Tablets “N.C.P.”

【成分】 每錠含有

Dimethicone.....25mg
Aluminum hydroxide-magnesium carbonate.....275mg
Magnesium hydroxide.....100mg
賦形劑：Lactose、Methylcellulose、Magnesium Stearate

【作用】

1. 活性 Dimethicone 能降低液面之表面張力，有消泡力，而產生排氣作用，驅除腸內氣泡。
2. 氫氧化鋁、氫氧化鎂為緩衝性制酸劑具有中和胃酸之作用。

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多；解除脹氣緩解脹氣相關症狀。

【用法用量】

成人及 12 歲以上，每次二錠，一天 3-4 次，或需要時服用，嚼碎後吞服。6 歲以上未滿 12 歲，每次一錠。3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠。3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫生診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 1、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

- (一) 除非有醫師藥師藥劑生指示，請依循下列情況服用：
- 1、對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中乳糖含量不得超過 5g。
 - 2、未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - 3、(1) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
(2) 制酸劑不得併用其他藥品。
- (二) 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- (三) 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- (四) 本藥含鋁之制酸劑成分可能引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- (五) 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。
- (六) 本藥含鎂之制酸劑成分可能引起腹瀉。
- (七) 本藥含碳酸鹽之制酸劑成分，可能引起腹痛、打嗝。
- (八) 單次劑量之酸中和能力為 8.5mEq；含鎂量為 4.62mEq。

【包裝】 12-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【儲存條件】 25°C 以下儲存。



新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號